



Soluții Syngenta
pentru cultura
de rapiță

syngenta®

®



Cuprins

SEMINȚE

NK Technic	1
NK Petrol	2
Nelson	3
SY Harnas	4
SY Vesuvio	5

ERBICIDE

 DualGold	9
 FusiladeForte®	10
 Zellek® Super	11
 Galera® Super	12
 Lontrel® Grand	13

FUNGICIDE

 RidomilGold®	14
 AmistarXtra®	15

INSECTICIDE

 KarateZeon®	17
--	----

PRINCIPALII DĂUNĂTORI ȘI PRINCIPALELE BOLI DIN CULTURA DE RAPIȚĂ	18
--	----

NK Technic

Tehnica profitului!

Hibrid timpuriu



Productivitate



Toleranță la scuturarea
boabelor din silice



Vigoare bună
la răsărire



Toleranță bună
la iernare


AVANTAJE:

- Cea mai bună toleranță la temperaturi scăzute
- Producții foarte bune și constante
- Bună toleranță la secetă
- Cel mai bine vândut hibrid timpuriu din portofoliul Syngenta


PARTICULARITĂȚI

- Toleranță la *Phoma*, *Sclerotinia* și *Verticillium*
- Posedă o bună rezistență la polignire și scuturare
- Conținut ridicat de ulei
- Vigoare foarte bună
- Înflorire timpurie, plantă de talie medie
- Coacere uniformă, pierdere rapidă a umidității
- Densitatea recomandată la semănat: 50-60 semințe/m²

Rezultate obținute în condițiile tehnologice din fermă



anul 2015



anul 2014



SAFECROSS™

NK Petrol

Vigoare și producții ridicate!

Hibrid timpuriu



Productivitate



Toleranță bună
la iernare

AVANTAJE:



- Potențial de producție foarte înalt
- Conținut ridicat de ulei

PARTICULARITĂȚI

- Este primul hibrid SAFECROSS™ în lume
- Rezistență foarte bună la iernare
- Se adaptează foarte bine la condițiile din perioada germinării
- Tolerant la condițiile de stres termic și hidric
- Nivel scăzut de glucozinolați
- Maturare uniformă
- Densitatea recomandată la semănat:
50-60 semințe/m²



Rezultate obținute în condițiile tehnologice din fermă



Nelson

Un învingător

Hibrid semi-timpuriu



Productivitate



Toleranță la scuturarea
boabelor din silice



Toleranță la
Phoma



Toleranță bună
la iernare



AVANTAJE:

- Potențial de producție excepțional
- Robust, aspect fizic impresionant
- Cel mai bine cunoscut hibrid din portofoliul Syngenta

PARTICULARITĂȚI

- Rezistent la scuturare și la polignire
- Vigoare bună la ieșirea din iarnă
- Toleranță la *Phoma*
- Conținut ridicat de ulei
- Talie medie-înaltă
- Capacitate de ramificare deosebită
- Coacere uniformă - pretabil pentru recoltare directă
- Bună adaptabilitate în zonele de cultură a rapiței în Moldova
- Densitate recomandată la semănat: 50-60 semințe/m²

Rezultate obținute în condițiile tehnologice din fermă





SY Harnas

Performant în fiecare sezon

Hibrid semi-timpuriu



Productivitate



Vigoare bună
la răsărire



Toleranță bună
la iernare



Toleranță la scuturarea
boabelor din silice



Toleranță la
Phoma

AVANTAJE:

- Vigoarea bună din toamnă
- Asigură cel mai bun start al culturii de rapiță
- Toleranță bună la iernare datorită instalării bune a culturii încă din toamnă
- Conținut bun de ulei

PARTICULARITĂȚI

- Toleranță bună la cădere
- Dezvoltare bună în primăvară având înflorirea timpurie și o prelungire a perioadei fotosintetice
- Talie medie și compactă
- Face față presiunii de boli, având toleranță bună la *Phoma*
- Adaptabil la toate condițiile de sol
- Densitate recomandată la semănat: 50–60 boabe/m²



SAFECROSS™

SY Vesuvio

Atinge randamentul maxim

NOUȚATE

Hibrid semi-timpuriu



Productivitate



Ramificare puternică


AVANTAJE:

- Producții mari și stabile
- Dezvoltare rapidă și viguroasă în toamnă
- Conținut bun de ulei

PARTICULARITĂȚI

- Talie medie și compactă
- Capacitate de ramificare foarte bună
- Performanță bună în condiții de temperaturi înalte și secetă
- Toleranță bună la cădere
- Toleranță la *Phoma*
- Timpurietate la înflorire: medie
- În condiții de soluri bune cu aport suficient de apă, valorifică foarte bine condițiile dovedindu-și potențialul de producție
- Potrivit pentru semănat în sistem minimum tillage
- Densitatea recomandată la semănat: 50-60 semințe/m²

Rezultate obținute în condițiile tehnologice din fermă



Putere de ramificare, vigoare și producții ridicate



Una dintre cele mai promițătoare culturi ale companiei Syngenta este rapița. Astăzi compania noastră este unul dintre cei mai importanți producători de semințe de rapiță. Hibrizii Syngenta sunt bine cunoscuți și foarte solicitați în rândul agricultorilor din vestul și centrul Europei. Datorită investițiilor active în cercetare și dezvoltare, Syngenta are o bază științifică și tehnologică puternică pentru crearea de hibrizi noi, extrem de productivi.



Cercetătorii companiei noastre au dezvoltat un sistem inovativ de hibridizare, bazat pe moștenirea de tip nucleară, numit SAFECROSS™. Astfel, noul sistem a fost capabil de a îmbunătăți în mod semnificativ productivitatea hibrizilor de rapiță Syngenta, rezistența lor la factorii de stres și la boli.

Hibrizii de rapiță SAFECROSS™ au obținut cu succes înregistrarea în majoritatea țărilor din Europa. Patru dintre aceștia **NK Petrol**, **NK Technic**, **SY Harnas** și **SY Vesuvio** sunt deja înregistrați și în Moldova.

Hibrizii de rapiță ai companiei Syngenta au un nivel ridicat de rezistență la iernare, un conținut înalt de ulei și un excelent potențial de productivitate atunci când este respectată tehnologia de cultivare.



Program tehnologic pentru cultura de rapiță

Problema \ Stadiul de dezvoltare							
Dăunători de sol și de frunze din primele faze de dezvoltare	 CruiserOSR 12,0-15,0 l/t						
Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	 DualGold 1,3-1,6 l/ha						
Buruieni monocotiledonate anuale și perene		 Fusilade Forte® 0,75-1,5 l/ha					
		 Zellek® Super 0,4-1,0 l/ha					
Buruieni dicotiledonate anuale și perene		 Galera® Super 0,15-0,3 l/ha					
		 Lontrel® Grand 0,12-0,2 kg/ha					
Mană, alternarioză			 RidomilGold® 2,5 kg/ha				
Putregai alb, fomoza, alternarioza			 AmistarXtra® 0,75 l/ha				
Puricii cruciferelor, gândacul lucios		 KarateZeon® 0,15 l/ha			 KarateZeon® 0,15 l/ha		

 Tratament sămânță
  Erbicide
  Fungicide
  Insecticide

Putere pentru performanță!

CRUISER OSR reprezintă soluția unică și completă pentru tratamentul semințelor de rapiță.

Protejează sămânța și tânăra plantă, în primele faze de vegetație, împotriva principalilor dăunători și boli transmise prin sămânță și sol, inclusiv mana.

În multe cazuri s-a observat că plantele provenite din semințe tratate cu CRUISER OSR dezvoltă rădăcini mai lungi și tulpină mai viguroasă.

Permite o absorbție mai bună a apei și a substanțelor nutritive și o dezvoltare mai bună a culturii.



 **Cruiser® OSR**

syngenta®



Boli și insecte
controlate

+



Vigoare

=



Producție
ridicată

®



Erbicid

Ambalat la
5 litri

Erbicid selectiv pentru cultura de rapiță

- Posedă o selectivitate foarte bună pentru cultura de rapiță.
- Excluce concurența din partea buruienilor în cele mai critice fenofaze de dezvoltare.
- Acțiune de lungă durată, ceea ce permite controlul buruienilor care apar eşalonat.
- Nu prezintă pericol pentru culturile din asolament.
- Poate fi utilizat în amestec cu alte erbicide.

Cultura	Spectru de combatere	Norma de consum, l/ha	Faza de aplicare	Timp de pauză (numărul maxim de tratamente)
Rapiță	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	1,3-1,6	Prin stropirea solului până la semănat cu încorporare	- (1)
Substanța activă: S-metolaclo, 960 g/l				



Erbicid

Ambalat la
5 litri

Putere și flexibilitate în combaterea gramineelor

- Combate efectiv toate buruienile monocotiledonate anuale și perene.
- Este absorbit de frunze și translocat spre rădăcini în scurt timp după aplicare.
- Este rezistent la spălare de ploii deja după 1-2 ore de la aplicare.
- Poate fi utilizat în amestec cu alte produse de uz fitosanitar.
- Comod în aplicare.

Cultura	Spectru de combatere	Norma de consum, l/ha	Faza de aplicare	Timp de pauză (numărul maxim de tratamente)
Rapiță	Buruieni monocotiledonate anuale	0,75	Prin stropirea semănăturilor în perioada de vegetație (în faza de 2-4 frunze ale buruienilor)	- (1)
	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,5	Prin stropirea semănăturilor în perioada de vegetație la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene	- (1)

Substanța activă: fluazilofop-P-butil, 150 g/l



Erbicid

Ambalat la
5 litri

Elimină pentru totdeauna buruienile monocotiledonate perene

- Eficient în combaterea tuturor buruienilor monocotiledonate anuale și perene.
- Are proprietăți sistice și în scurt timp după administrare este depistat în toate punctele de creștere, inclusiv ale rădăcinilor.
- Acționează foarte bine și în combaterea buruienilor trecute de faza optimă, cu condiția rectificării dozei.
- Norma de consum este flexibilă, care depinde de buruieni și de faza lor de dezvoltare.
- Este foarte selectiv față de cultura de rapiță.
- Deja după o oră de la administrarea produsului, nu mai există riscul ca el să fie spălat de precipitații.
- Datorită distrugerii sistemului radicular al buruienilor, se exclude apariția buruienilor - problemă pentru următoarele culturi.

Cultura	Spectru de combatere	Norma de consum, l/ha	Faza de aplicare	Timp de pauză (numărul maxim de tratamente)
Rapiță	Buruieni monocotiledonate anuale	0,4	Prin stropirea semănăturilor în faza de 2-4 frunze ale buruienilor anuale	- (1)
	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,0	Prin stropirea semănăturilor la înălțimea de 10-15 cm a buruienilor perene	- (1)

Substanța activă: haloxifop-R-ester metilic, 108 g/l

**Erbicid****Ambalat la
5 litri**

Alegerea care face diferență în combaterea buruienilor din rapiță

- Datorită compușilor activi, erbicidul Galera Super 364 SL combate o varietate largă de buruieni.
- Posedă o eficacitate excepțională în combaterea buruienilor - problemă (pălămidă, susai, mușețel, albăstrițe, turița, mac roșu etc.) din cultura de rapiță.
- Asigură controlul buruienilor datorită acțiunii sistemice asupra lor.
- Previne apariția buruienilor rezistente față de produs datorită substanței active Picloram.
- Câmpurile tratate cu erbicidul Galera Super 364 SL rămân curate pentru următoarele culturi.
- Nu are restricții în assolament.
- Este foarte flexibil în alegerea perioadelor de administrare.
- Este compatibil cu alte produse de uz fitosanitar.

Cultura	Spectru de combatere	Norma de consum, l/ha	Faza de aplicare	Timp de pauză (numărul maxim de tratamente)
Rapiță	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	0,15-0,3	Prin stropirea semănăturilor toamna sau primăvara, până la apariția butonilor flo- rali (8-10 frunze la rapiță)	- (1)

Substanța activă: clopiralid+picloram+aminopirialid, 267+80+17 g/l



Erbicid



Ambalat la
2 kg

Erbicid postemergent pentru un control sigur al buruienilor dicotiledonate perene din rapiță

- Erbicid selectiv cu proprietăți sistemice unice.
- Efectiv în combaterea buruienilor problemă (susai, pălămidă) din semănăturile de rapiță.
- Distruge aparatul foliar și rădăcinile, astfel înlătură buruienile greu de combătut.
- Soluție sigură în combaterea buruienilor anuale și perene.
- Este foarte bine metabolizat de culturile la care este recomandat.
- Noua formă preparativă cu un conținut mai mare de substanță activă îl face mult mai comod de utilizat.
- Este rezistent la spălarea de precipitații după 1-2 ore de la administrare.

Cultura	Spectru de combatere	Norma de consum, kg/ha	Faza de aplicare	Timp de pauză (numărul maxim de tratamente)
Rapiță	Specii de pălămidă, hrișcă, romaniță, susai	0,12 - 0,2	Prin stropirea semănăturilor în faza de 3-4 frunze ale culturii	- (1)

Substanța activă: clopiralid, 750 g/kg



Fungicid

Ambalat la
5 kg

O soluție eficientă împotriva agenților patogeni care provoacă mană

- Acțiune sistemică, translaminară și de contact în combaterea ciupercilor din clasa oomicetelor (agenți patogeni ce provoacă mană).
- Descompunere rapidă în sol.
- Conține două substanțe active din grupe chimice și cu mecanism de acțiune diferit.
- Protejează creșterile noi.
- Forma preparativă comodă și ușor de utilizat.
- Se dizolvă rapid în apă, ceea ce permite formarea calitativă a soluției de lucru.

Cultura	Spectru de combatere	Norma de consum, kg/ha	Faza de aplicare	Timp de pauză (numărul maxim de tratamente)
Rapiță	Fomoza, alternarioza, mana	2,5	Prin stropire în perioada de vegetație	14 (2)

Substanța activă: mancozeb+mefenoxam, 640+40 g/kg



Fungicid

Ambalat la
5 litri

Xtra recoltă, Xtra Calitate, Xtra Profit

- Este compus din două substanțe active, ambele din grupe chimice și cu mecanism de acțiune diferit.
- Influențează pozitiv asupra proceselor fiziologice ale plantelor.
- Ridică imunitatea plantelor și toleranța lor la condiții critice de mediu.
- Optimizează asimilarea azotului.
- Inhibă sinteza etilenei.
- Prolungește perioada de vegetație – “green effect”.
- Spectru larg de boli prevenite și combătute.
- Posedă acțiune antisporulantă.
- Flexibil în perioada de utilizare.
- Fotostabilitate înaltă.
- Penetrează rapid țesuturile plantei.
- Rezistent la spălări de precipitații.
- Compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar.

Cultura	Spectru de combatere	Norma de consum, l/ha	Faza de aplicare	Timp de pauză (numărul maxim de tratamente)
Rapiță	Putregai alb, fomoza, alternarioza	0,75	Prin stropire în perioada de vegetație	21 (1-2)

Substanța activă: azoxistrobin+ciproconazol, 200+80 g/l

XTRA SIGURNAȚĂ fără costuri suplimentare!

Mai mult conținut
de ulei

Mărește perioada
de umplere a bobului



Recoltă înaltă și
de calitate

Protecție împotriva
bolilor

Efect fiziologic unic
- "green effect"

Fotostabilitate
ridică

Acțiune:
Sistemică
Translaminară
De contact

 **Amistar Xtra**[®]

syngenta[®]

Soluția Syngenta pentru combaterea bolilor este Amistar Xtra:

fungicid modern, cu spectru larg de acțiune, care prelungește perioada de timp în care cultura de rapiță rămâne verde ("green effect")

®



Insecticid

Ambalat la
5 litri

Deseori imitat, niciodată egalat

- Insecticid de contact.
- Posedă efect rapid și de șoc pentru dăunători.
- Acțiune de lungă durată.
- Eficient în combaterea dăunătorilor rozători și sugători.
- Nu este fitotoxic pentru culturile agricole.
- După administrare se fixează bine în stratul de ceară, ceea ce îl face mai stabil la spălări de precipitații și de insolație.
- Este creat după tehnologia ZEON.
- Compatibil cu alte produse de uz fitosanitar.

Cultura	Spectru de combatere	Norma de consum, l/ha	Faza de aplicare	Timp de pauză (numărul maxim de tratamente)
Rapiță	Gâdăcul lucios al rapiței, puricii cruciferelor	0,15	Prin stropire în faza de îmbobocire a culturii	30 (1)

Substanța activă: lambda-cihalotrin, 50 g/l

Principalii dăunători și principalele boli din cultura de rapiță

DĂUNĂTORI

Puricii cruciferelor (<i>Phyllotreta sp.</i>)	19
Gândacul lucios (<i>Meligethes aeneus</i>)	21

BOLI

Fomoza (<i>Phoma lingam</i>)	23
Putregaiul alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	25
Alternarioza (<i>Alternaria brassicae</i>)	27

Puricii cruciferelor (*Phyllotreta* sp.)

Atac pe cotiledoane în toamnă



- O singură generație pe an
- Iernează ca adult în zona superficială a solului, sub resturile de plante
- Când temperaturile depășesc 8°C, începe perioada de hrănire:
 - rod epiderma superioară și mezofilul frunzelor, iar epiderma inferioară rămâne intactă
 - frunzele au aspect „ciuruit”

Adult pe rapiță



IMPORTANT!

Utilizați  **KarateZeon®** pentru combaterea puricilor cruciferi!



- Puricii cruciferelor - purici negri
 - adulții apar în iunie-iulie, atacând până în luna noiembrie
 - daune mari se înregistrează în condiții de secetă
 - larvele trăiesc în sol și nu produc pagube



- o femelă depune eşalonat cca 300 ouă până în luna iulie
- incubația este de 10-25 de zile
- larvele pătrund sub epiderma radicelelor și creează spații superficiale în rădăcini
- în septembrie apar adulții noii generații

Gândacul lucios (*Meligethes aeneus*)



- O generație pe an
- Începe să se reproducă în stadiul de adult în stratul superficial al solului la 2-3 cm adâncime sau sub resturile vegetale
- Atacă rapița chiar înainte de înflorire
- Câmpurile unde apar primele flori sunt cele mai susceptibile, gândacul fiind atras de luminozitatea galbenului florilor
- Ouăle sunt depuse în butonii florali (400 de ouă; câte 1-2 ouă în fiecare perforație)
- Adulții atacă butonii florali, hrănindu-se cu polen și nectar; prin roaderea pistilului, are loc fenomenul de sterilitate și cădere prematură a florilor
- Larvele se hrănesc cu polen, cu petale și antere și nu produc pagube la fel de mari ca adulții



IMPORTANT!

Utilizați  **KarateZeon®** pentru combaterea gândacului lucios din cultura de rapiță! Aplicați la apariția primelor insecte în câmp!



Cum combatem gândacul lucios?

DĂUNĂTORI

Ou



Larve pe butonul floral



Adulți pe butonul floral


IMPORTANT!

Utilizați capcane galbene din plastic pentru
a detecta activitatea insectelor!

Determinați astfel
perioada optimă pentru tratament!


IMPORTANT!

Utilizați  **KarateZeon®** pentru
combateră!



Fomoza (*Phoma lingam*)

- Atacul se manifestă pe frunze și pe tulpini

- Pe cotiledoane și frunzele adevărate apar pete circulare, galben-brune, cu centrul cenușiu-albicios

- Apar puncte negre (picnidii - fructificațiile ciupercii) care conțin milioane de spori și pot fi transportați la distanțe de peste 8 km

- Necrozele de pe colet limitează alimentarea părții aeriene, slăbirea țesuturilor, frângerea tulpinii, deschiderea prematură a silicvei, și în final, pierderi de producție

- Petele pe frunze nu sunt foarte dăunătoare, atacul la colet provoacă pagube


- **Phoma – startul în toamnă!**

- este cea mai păgubitoare boală pentru cultura de rapiță
- prima infecție are loc în toamnă
- infecția la tulpină este foarte importantă
- cu cât infecția are loc mai devreme în toamnă, cu atât mai mare și mai puternică este contaminarea mai târziu, în luna mai
- primele simptome apar devreme în toamnă sub forma unor pete pe frunze (poza 1), mai târziu sunt vizibile niște puncte închise la culoare (picnidiile) (poza 2) și (poza 3)
- leziunile produse de *Phoma* în toamnă duc la îmbolnăvirea tulpinii în primăvară cu pierderi de producție de până la 25%

Poza 1



Poza 2



Poza 3



Poza 4




Poza 5



IMPORTANT!

Utilizați **AmistarXtra®**
pentru combaterea
fomozei!

Ciclul de dezvoltare a bolii:



Putregaiul alb (*Sclerotinia sclerotiorum*)



- *Sclerotinia* își începe atacul în aprilie-iunie prin germinarea sporilor din sol, când aceștia au condiții favorabile, respectiv temperatura în sol crește peste 6-10°C. Se formează fructificații care eliberează ascosporii (formă de rezistență a patogenului).
 - sporii luați de vânt se împrăștie pe petale și frunze unde își încep atacul asupra plantei de rapiță
 - primele leziuni apar, în mai iar atacul sever pe frunze, tulpină și ramificații duce la îngălbenirea și căderea prematură a plantelor
 - prin plantele atacate, *Sclerotinia* își continuă ciclul de înmulțire
 - plantele bolnave prezintă fenomenul de îngălbenire și ofilire
 - pe tulpină se observă zone de culoare deschisă, albe sau galben-deschise
 - zonele afectate se acoperă cu o pâslă albă (miceliul ciupercii) în care se formează mai târziu scleroții; țesuturile tulpinii sunt distruse, iar planta nu mai este aprovizionată cu elemente nutritive deasupra locului unde este afectată
 - scleroții sunt de culoare neagră, de forme diferite și mărimi variate



IMPORTANT!

Utilizați **AmistarXtra®**
pentru combaterea
putregaiului alb!



Apariție pe frunză



Scleroți pe tulpină




Părți decolorate ale plantei



- pe frunză apar alterări și necrozări ale țesuturilor;
- la 8-10 zile de la înflorire, când petalele încep să cadă, se produce infecția frunzelor, apoi a pețiolului și, în final, a tulpinii (manșon alb)
- silicvele se decolorează și se deschid prematur
- se transmite prin scleroți, care rezistă în sol 6-8 ani
- apariția bolii este influențată de umiditatea atmosferică ridicată și o temperatură moderată de 14-25° C

Ciclul de dezvoltare a bolii:



Alternarioza (*Alternaria brassicae*)



- Atacul este exploziv în perioadele umede și calde
- Pe frunze se formează pete circulare brun-cenușii, negricioase, încadrate de un halou galben de decolorare; aceleași pete alungite, negricioase apar pe tulpini și pe linia de sudură a silicvei; zonele atacate se înnegresc, silicvele crapă; înregistrăm pierderi de producție de aproximativ 25%
- Se aplică două tratamente; cel mai important este aplicat la căderea petalelor (control și asupra *Sclerotinia*)



IMPORTANT!

Utilizați **AmistarXtra®**
pentru combaterea
alternariozei!

Echipa Syngenta Moldova

Oleg Cojocar*Director Suport Vânzări*

tel.: 069 225 152

e-mail: oleg.cojocar@syngenta.com

Alexandru Neamtu*Reprezentant Suport Vânzări*

tel.: 069 348 001

e-mail: alexandru.neamtu@syngenta.com

Violeta Severin*Specialist Marketing*

tel.: 060 977 000

e-mail: violeta.severin@syngenta.com

Alena Abdurahmanova*Manager Înregistrări*

tel.: 069 124 309

e-mail: alena.abdurahmanova@syngenta.com

Distribuitori produse rapiță

Vadalex-Agro SRL

str. L. Deleanu 7/6, Chișinău, MD 2071

tel.: 022-605-944, 022-605-949, 022-605-940

Gold Corn SRL

str. Shevchenko 92, Tiraspol, MD 3301

tel.: 069967087, 078852055

Licorent-Agro SRL

str. Suveranității 12, Glodeni, MD 4901

tel.: 0249-22-240

CP C.V.A. - VIROCAGRO

str. Independenței 36/A, Soroca, MD 3001

tel.: 0230-33-876

Protecția Plantelor SRL

str. Betania 2, Ialoveni, MD 6801

tel.: 0268-85-901



Reprezentanța SA Syngenta Agro Services AG
din Republica Moldova
Str. Pușkin 47/1, block A, oficiul 2
MD 2005, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 243 275
Tel./Fax: +373 22 204 750

www.syngenta.md

® = marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta.
Toate drepturile asupra acestui catalog revin Reprezentanței din Moldova
SA Syngenta Agro Services AG.

**Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna
eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Respectați
indicațiile privind riscurile specifice și urmăriți măsurile specifice de
siguranță înscrise pe eticheta produsului.**

În caz de accidente sau în situații de urgență sunați, la Syngenta Alarm
Centre, Huddersfield, Anglia. Tel.: +44 1484 538 444; Fax: +44 1484 554 093