


## APLICAȚII FOLIARE

PENTRU PLANTAȚIILE INTRATE PE ROD

LĂSTARIILE DIN MUGURII TERMINALI ATING CCA 2 CM

Df

- > CÂND CCA 40% SUNT LA ETAPA **Df** SE EFECTUEAZĂ PRIMA APLICAȚIE CUPRICĂ
- > A DOUA APLICAȚIE ESTE EFECTUATĂ PESTE CCA 10 – 14 ZILE



# APLICAȚII FOLIARE

## PENTRU PLANTAȚIILE INTRATE PE ROD

### PERIOADA DE APLICARE A PRODUSELOR CUPRICE

1A APLICAȚIE

2A APLICAȚIE

+ MANCOZEB\*

NU SE APLICĂ PRODUSE CUPRICE,  
RISC DE FITOTOXICITATE

Af

Af2

Bf

Cf

Cf2

Df

Df2


Ff

Ff1


Ff2

Ff3

Gf



## APLICAȚII FOLIARE PENTRU PLANTAȚIILE INTRATE PE ROD




3 kg Zn SO<sub>4</sub> / 900 L apă  
Aplicat când lăstarul  
terminal atinge 15 cm  
lungime

Două elemente de  
importanță critică pentru nuc

- BOR
- ZINC

## APLICAȚII FOLIARE PENTRU PLANTAȚIILE INTRATE PE ROD



Două elemente de importanță critică pentru nuc

BOR

ZINC

La soiurile sensibile la excesul de polen