




GARANȚIA UNEI
RECOLTE ÎNALTE



CATALOG 2026

Distribuitori și consultanți regionali a produselor S.C. „Slatava Grup” S.R.L.



CATALOG 2026



GARANȚIA UNEI
RECOLTE ÎNALTE

S.C. „Slatava Grup” S.R.L. este o companie ce activează în sectorul agrar al Republicii Moldova de peste 20 de ani. Are în portofoliu său peste 2000 de clienți din toate zonele țării cât și propriile suprafețe plantate cu livezi de măr, prun, vița de vie și culturi cerealiere. Totodată a fost mereu în căutare de alternative și inovații, propunând soluții mai bune agricultorilor, astfel creând valoare adăugată pentru clienții noștri. Datorită experienței bogate în segmentarea pieței agricole, răspunde nevoilor agricultorilor și poate oferi pe parcursul întregului proces soluții diferențiate și universale de protecție a plantelor.

De-a lungul anilor, a dat dovadă de profesionalism și dăruire de sine, câștigând astfel recunoașterea și încrederea clienților din întreaga țară. Prezența zilnică a specialiștilor în protecția plantelor în fiecare zonă a țării: Nord, Centru și Sud, facilitează depistarea și soluționarea unei eventuale probleme în timp foarte scurt. Sfaturile și soluțiile propuse sunt susținute și de către cei mai buni doctori habilitați în agricultură din Republica Moldova.

Din multitudinea companiilor producătoare de pesticide, S.C. „Slatava Grup” S.R.L. a creat un parteneriat de succes cu **Ningbo Sunjoy Agrosience Co. Ltd.**, bazat pe calitățile și realizările lor înalte. Începând cu anul 2014 produsele ei au fost înregistrate și importate în Republica Moldova, având an de an o ascensiune atât în departamentul înregistrării de noi preparate, cât și în sectorul de vânzări, astfel la sfârșitul anului are deja omologate în Republica Moldova numeroase preparate de tip: insecticide, fungicide și erbicide, cât și produse pentru tratarea semințelor. Iar tendința de dezvoltare este ca în următorii 2-3 ani să dețină omologarea a până la 100 de produse, punând accentul pe cele bio, benefice mediului înconjurător.

Echipa responsabilă de înregistrare a Ningbo Sunjoy Agrosience Co. Ltd este familiarizată cu politicile și reglementările privind înregistrarea pesticidelor din întreaga lume și a oferit servicii de înregistrare și asistență tehnică cu privire la cca 6000 de produse pentru mii de clienți din 88 de țări, așa ca Spania, Germania, Polonia, Ungaria, Romania, Moldova etc.

Cu **S.C. „Slatava Grup” S.R.L.** ai garanția unei recolte înalte!

S.C. „Slatava Grup” S.R.L.

Nicolae Gordila, agronom-șef: (+373) 69 16 22 91
Aliona Chercheja, agronom principal: (+373) 69 08 11 30
slatavagrup@gmail.com
www.slatavagrup.md



Cuprins



ACARICIDE

Acarin WP	4
Piromait 50 SC	6



INSECTICIDE

Arumo SC	8
Delfox 25 EC ■	10
Juvenal 10 EC ■	12
Mospelat 20 SL	14
Proclein 5 WG	16
Rapigen 20 SC	18
Runerr 24 SC	20
Tepechi 50 WG	22
Zenin 25 SC	24



FUNGICIDE

Azoxin 25 SC	26
Bercus WG	28
Boscad 50 WG	30
Cooper-M 45 WP	32
Delin 70 WG ■	34
Efalin 80 WP	36
Flint Stars SC	38
Folipex 80 WG ■	40
Forsaj 62,5 WG ■	42
Kapton 80 WG ■	44
Kuprumacs 840 DF	46

Magnat 75 WG	48
Nanto 50 SC ■	50
Neo Super SC	52
Nobel 25 EW	54
Nordox 750 WG	56
Norus 75 WG	60
Rotengo 20 SC	62
Scalos 400 SC	64
Scorus 25 EC	66
Stroly 50 WG	68
Topik 10 EC	70
Topstar SC ■	72



ERBICIDE

Floramix SE	74
Glifor 480 SL	76
Grin Star 75 WG	78
Ilumins 105 OD	80
Imox 40 SL	82
Miuris 125 EC	84
Radial 4 OD	86
Star Super EC	88



TRATAREA SEMINTELOR

Tripto Max SC	90
---------------------	----



ADJUVANȚI

Trant	92
-------------	----

■ Produse în proces de extindere

FORMA PREPARATIVĂ:
pulbere umectabilă (WP)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – III/III

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-04-15-01-1885 din 15.04.2025

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Acarin WP este un acaricid cu acțiune de contact și ingestie, care inhibă respirația mitocondrială a acarienilor. Preparatul se caracterizează prin toxicitate înaltă față de dăunători și termen de protecție sporit a culturii.

PROPRIETĂȚI:

- Acționează asupra tuturor stadiilor de dezvoltare (ouă-larve-adulți) puternic pronunțată acțiunea ovicidă (la apariția populației de vară).

- Limitează recolonizarea acarienilor.
- Selectivitate înaltă, nu acționează asupra masculilor și acarienilor răpitori.
- Inofensiv pentru albine (poate fi aplicat în perioada înfloririi).

AVANTAJE:

- Prezintă proprietăți transaminare, sublimând astfel acarienii și pe partea inferioară a frunzei.
- Este eficient într-un diapazon mare de temperaturi.



- Compatibil cu multe fungicide, insecticide și fertilizanți foliari.
- Aderență bună pe plante, rezistență mare la precipitații.
- Nu este fitotoxic pentru plante.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Acarieni	0,4 - 0,5	30 (1-2)	7 (3)
Prun			21 (1-2)	
Vița de vie	Acarianul roșu comun		14 (1)	

Norma de consum a soluției de lucru: măr, prun: 800-1500 l/ha; vița de vie: 600-800 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- Folosiți un volum de soluție suficient pentru a asigura o bună acoperire a foliajului.
- Se aplică primăvara la ieșirea a 70-80% a larvelor.
- Vara – la apariția populației de vară.



Piromait 50 SC

ACARICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: fenpiroximat 50 g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – III/III

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-11-21-01-2013 din 21.11.2025

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Piromait 50 SC este un acaricid, pe bază de fenpiroximat, aparținând familiei fenoxipirazolilor, cu acțiune de contact și ingestie asupra dăunătorului. Fenpiroximat-ul inhibă transferul de electroni din mitocondrii și afectează sistemul respirator al acarianului. În final se produce moartea acarienilor. Este deosebit de potrivit pentru controlul acarienilor păianjenul roșu și al acarienilor eriofizi în numeroase culturi (măr, prun, cireș și viță de vie).

PROPRIETĂȚI:

Fenpiroximat-ul oferă o inhibare rapidă, un control de lungă durată și inhibă depunerea ouălor de către acarienii femele.

AVANTAJE:

- Acțiune de contact și indigestie asigură o protecție excelentă a culturii.
- Activ împotriva tuturor formelor mobile (larve, nimfe și adulți).
- Acțiune de șoc asupra adulților, larvelor și nimfelor, la o zi după

tratament, acarieni nu se mai hrănesc și nu mai produc pagube.

- Eficient și de lungă durată (21-28 zile) la doza recomandată pentru cultura țintă.
- Nu are rezistență încrucișată cu alte acaricide convenționale.
- Rezistență excelentă la spălare și la temperaturi ridicate.
- Prietenos cu insectele benefice, se încadrează în programul de combatere integrat al dăunătorilor (IPM - Integrated Pest Management).



COMPATIBILITATE:

Conform recomandărilor producătorului, **Piromait 50 SC**, poate fi amestecat cu cele mai utilizate pesticide și îngrășăminte foliare. Înainte de utilizare a unui amestec, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate în prealabil și un test preliminar pe câteva plante înainte de a se face aplicații la scară largă. Nu se amestecă cu sulfat de cupru și zeamă bordoleză.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Acarianul păducelului Acarianul roșu al pomilor	1,0 - 1,5	21 (1)	7 (3)
Cireș	Acarieni		21 (1)	
Prun			14 (1)	
Vița de vie	Acarianul roșu comun		35 (1)	

Norma de consum a soluției de lucru: măr, prun, cireș: 1000-1500 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- Perioada optimă de aplicare este atunci când populația de acarieni începe să crească, iar aplicarea preventivă este cea mai eficace și cu un efect de lungă durată.

- Deoarece este un produs de contact, pentru a asigura o eficacitate bună, umeziți bine și uniform toată vegetația, inclusiv partea inferioară a frunzelor și a părților mai puțin expuse ale butucilor de viță de vie.
- Utilizarea **Piromait 50 SC**, alternând cu acaricide cu diferite mecanisme de acțiune, reduce dezvoltarea rezistenței.



INSECTICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: acetamiprid 200 g/l
+ lambda cihalotrin 150 g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – III/I

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 24-02-15-01-1504 din 15.02.2024

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Arumo SC este un insecticid complex, combinat din două substanțe active din diferite clase chimice și cu diferite mecanisme de acțiune.

Arumo SC prezintă un insecticid extrem de eficient cu dublă acțiune, sistemică și de contact (de șoc), și remanență îndelungată împotriva unei game largi de dăunători sugători și rozători.

Cele două componente active acționează diferit, astfel:

Acetamiprid (componenta sistemică) – din grupa produselor neonicotinoide, care interacționează cu receptorii nicotină-acetilcolină a membranei post sinaptice ca un concurent al acetilcolinei, ce provoacă dereglări la transmiterea impulsurilor nervoase prin sinapsă.

Lambda-cihalotrin (componenta de contact) – este un insecticid piretroid, eficient, cu o puternică acțiune de contact și ingestie asupra unei game largi de dăunători. După aplicare, substanța activă penetrează rapid cuticula insectei acționând asupra sistemului ner-

vos, dereglează activitatea oxidazei microsomale, membranelor celulare și terminațiile nervoase.

În scurt timp după administrare provoacă paraliza insectelor și moartea survine în 24-48 ore. După aplicare, produsul este absorbit rapid în plantă, iar eficacitatea nu este condiționată de temperatura aerului.

AVANTAJE:

- Insecticid cu două substanțe active diferite cu mecanism dublu de acțiune.
- Control rapid și sigur al unui spectru larg de dăunători rozători și sugători.
- Acțiune rapidă în toate stadiile de dezvoltare a dăunătorilor.
- Protejează culturile pe o perioadă de 10-14 zile de la aplicare, în funcție de condițiile climatice, presiunea atacului și tipul de dăunător.
- Nu este influențat de oscilațiile de temperatură.
- Prezintă rezistență foarte bună la căderile de precipitații.

COMPATIBILITATEA:

- Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de protecția plantelor. Înainte de utilizarea



oricărui amestec este recomandat să se facă un test de compatibilitate, iar soluția să se aplice pe cultura vizată.

ATENȚIE!!! *Arumo SC nu se aplică pe plante în timpul înfloritului fiind toxic pentru albine. Se recomandă cosiri repetate în livadă pentru distrugerea buruienilor înflorite.*

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Viermele merelor Molii torticide Păduchele verde al mărului	0,25 - 0,3	21 (1-2)	7 (3)
Prun	Viermele prunelor Viespea galbenă a prunelor Viespea semințelor de prun Păduchele cenușiu al prunului		14 (2)	

Norma de consum a soluției de lucru: 800-1500 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Produsul se aplică prin stropire cu echipamente terestre cu volumul necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului fo-

liaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției.

- Tratamentele se efectuează în zile fără vânt și în timpul orelor răcoroase ale zilei.
- Tratamentele se fac la avertizare sau la apariția insectelor dăunătoare.



INSECTICIDE



FORMA PREPARATIVĂ:
concentrat emulsionabil (EC)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – III/I

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-02-28-01-1808 din 28.02.2025

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Delfox 25 EC este un insecticid foliar pentru combaterea dăunătorilor din culturile horticole. Produsul acționează prin contact și ingestie asupra insectelor dăunătoare atât în stadiul de larve, cât și de adulți. Deltametrin este substanța activă care acționează asupra sistemului nervos al insectelor prin perturbarea transmiterii ionilor de natriu prin membrana sinaptică, drept urmare are loc paraliză și moartea insectei la numai câteva ore de la aplicare. Delfox 25 EC este un piretroid de sinteză ce paralizează sistemul nervos al insectei și prezintă un efect de doborâre rapidă (șoc) a insectelor, având în același timp și un efect repelent și antihîrănire.

AVANTAJE:

- Un avantaj al acestui produs este formularea acestuia de ultimă generație "picătură inteligentă", formulare care mărește aderența produsului la suprafața foliară, la corpul insectei, mărind penetrarea substanței active în



cuticula insectei, astfel sporind eficacitatea insecticidului.

- De asemenea formularea specială mărește rezistența la spălare a produsului prin precipitații.
- Este bine tolerat de plante și nu produce fitotoxicitate culturii tratate.
- Acțiune rapidă în toate stadiile de dezvoltare a dăunătorilor.
- Protejează culturile pe o perioadă de 7-10 zile de la aplicare, în funcție de condițiile climatice, presiunea atacului și tipul de dăunător.
- Stabilitate ridicată la temperaturi mari și lipsa fotosensibilității.

ATENȚIE! Delfox 25 EC nu se aplică pe plante în timpul înfloriturii fiind toxic pentru albine. Se recomandă cosiri repetate în livadă pentru distrugerea buruienilor înflorite.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Viermele merelor Viespea cu fereastră	0,9 - 1,0	30 (2)	7 (3)
Prun	Viermele prunelor Viespea galbenă a prunelor		28 (2)	
Cireș	Musca cireșelor	0,5 - 0,7	7 (2)	
Cais 	Molia orientală Molia vărgată a fructelor		În proces de extindere	
Grâu 	Tripsul grâului, ploșnițe			

Norma de consum a soluției de lucru: 800-1000 l/ha.

COMPATIBILITATEA:

Delfox 25 EC este compatibil cu majoritatea produselor de protecția plantelor, făcând excepție cele cu reacție alcalină (ex. Zeama Bordeleză tip „MIF”). Înainte de utilizarea oricărui amestec este recomandat să se facă un test de compatibilitate, iar soluția să se aplice pe cultură vizată.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Produsul se aplică prin stropire cu echipamente terestre cu volumul necesar de soluție, astfel

încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției.

- Tratamentele se efectuează în zile fără vânt și în timpul orelor răcoroase ale zilei.
- Tratamentele se fac la avertizare, la apariția dăunătorilor sau a primelor simptome de atac.
- Pentru evitarea creării formelor de rezistență ale insectelor se va alterna cu insecticide din grupe chimice diferite.
- Soluția de lucru trebuie utilizată în câteva ore de la preparare.

■ Produs în proces de extindere

FORMA PREPARATIVĂ:
concentrat emulsionabil (EC)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – III/III

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 21-12-22-01-1014 din 22.12.2021

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Juvenal 10 EC este un insecticid juvenoid sintetic cu conținut de substanța activă piriproxifen, aparține grupului regulatorilor de creștere a insectelor cu acțiune hormonală. Acționează prin inhibarea metamorfozei insectei, a embriogenezei și indirect, a reproducerii. Este destinat combaterii insectelor în timpul metamorfozei de la faza de ou și până la faza de adult, acționând ca sterilizant al femelelor.

PROPRIETĂȚI:

- Este un insecticid selectiv cu acțiune de contact și ingestie asupra dăunătorilor.
- Aplicarea produsului provoacă dereglări în echilibru



conținutului de hormoni și ca urmare larvele pier fără să atingă următoarea vârstă a ciclului biologic de dezvoltare.

- Anume excesul, neajunsul sau lipsa hormonului juvenil împiedică năpârlirea larvelor.

AVANTAJE:

- **Cel mai sigur insecticid contra păduchilor țestoși.**
- Administrat din momentul depunerii pantei și până la stadiul de larve de vârstă I, produsul reduce semnificativ populațiile de dăunători.
- Are o selectivitate ridicată la populațiile de insecte benefice.
- Degradare lentă în prezența luminii.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Păduchele din San Jose Viermele merelor	0,8 - 1,0	45 (1-2)	7 (3)
Prun	Viermele prunelor		14 (2-3)	
Varza	Musculița albă de seră		14 (1-2)	
Cireș 	Păduchele din San Jose		În proces de extindere	

Norma de consum a soluției de lucru: măr, prun, cireș: 800-1000 l/ha; varză: 300-400 l/ha.

- Protecție îndelungată prin reducerea populațiilor generațiilor viitoare.
- Componentă importantă în managementul integrat al dăunătorilor.



COMPATIBILITATEA:

Este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar. Pentru mai multă siguranță se va consulta lista de compatibilități și se va face un test de compatibilitate. Pentru o eficiență maximă, respectați momentul de aplicare și doza recomandată.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Contra păduchelui din San Jose tratamentele se efectuează pri-

■ Produs în proces de extindere

măvara: în faza de dezmugurire a pomilor (aprilie - prima decadă), sau vara: contra larvelor migratoare (iunie).

- Contra larvelor de viermele merelor, tratamentele se încep de la depunerea ouălor și până la inițierea penetrării în fructe a larvelor.
- De folosit un volum de soluție, în funcție de volumul masei foliare, astfel în cât să se asigure o acoperire cât mai uniformă și completă.





INSECTICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: acetamiprid 200g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
concentrant solubil (SL)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – III/III

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 20-06-11-01-0692 din 11.06.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Mospelat 20 SL este un insecticid sistemic, pe bază de acetamiprid, din grupa produselor neonicotinoide. Acetamiprid acționează asupra sistemului nervos central, interferând în transmiterea impulsurilor nervoase.

AVANTAJE:

- Este un insecticid sistemic, unic cu o excelență activitate translaminară.
- Formularea lichidă, foarte performantă și ușor de utilizat.
- Controlează un spectru larg de dăunători - rozători și sugători.
- Substanța activă a produsului are un efect knock-down.
- Prezintă o acțiune rapidă, provocând în scurt timp după administrare, paraliza și moartea insectei.
- Insectele sunt controlate de pe ambele fețe ale frunzei.
- Nu este afectat de temperatură, stabil în contactul cu razele solare.
- După aplicare, pătrunde translaminar în plante și nu este spălat de ploi sau apa de irigare.

- Non-fitotoxic pentru plantele cultivate.

COMPATIBILITATEA:

- Este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar sau fertilizanți, făcând excepție cele cu reacție alcalină (ex. Zeama Bordeleză) și uleiuri minerale. Pentru o folosire corectă trebuie de verificat compatibilitatea produselor care se vor amesteca.

TEHNICA DE APLICARE:

- Trebuie aplicat la dozele recomandate, în perioada de eclozare a primelor larve;
- Nu pulverizați în condiții de vânt;
- Nu aplicați înainte de 2-4 ore de ploaie;
- Produsul se aplică prin stropire cu echipamente terestre cu volumul necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Viermele merelor; Molii tortricide; Păduchele verde al mărului	0,3 - 0,45	28 (2-3)	7 (3)
Prun	Viespi; Viespea semintelor de prun; Păduchele cenușiu al prunului; Viermele prunelor		28 (2)	
Vița de vie	Cicorițe; Molia verde a strugurilor	0,2 - 0,3	7 (2)	
Cais	Molia orientală a fructelor; Păduchele verde al piersicului	0,25 - 0,3	14 (2)	7 (3)
Piersic	Molia orientală a fructelor; Păduchele verde al piersicului	0,3 - 0,4		
Cireș	Musca cireșelor; Păduchele negru al cireșului	0,25	45 (1)	-
Vișin	Musca cireșelor			
Grâu	Tripsul grâului; Păduchele verde al cerealelor; Gândacul ovăzului; Ploșnițe	0,25	28 (2)	7 (3)
Rapiță	Gândacul lucios al rapiței; Gărgărița tulpinilor de varză; Păduchele cenușiu al varzei; Tântărașul rapiței		7 (2-3)	
Cartof	Gândacul din Colorado	0,15 - 0,2	7 (2)	7 (3)
Tomate	Afide; Buha fructificațiilor			
Varză	Molia verzei; Păduchele cenușiu al varzei; Buha verzei; Abilitze; Purici			

Norma de consum a soluției de lucru: livezi: 1000-1500 l/ha;

vița de vie: 800-1000 l/ha;
legume și culturi de câmp: 300-400 l/ha.

Proclein® 5 WG



INSECTICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: benzoat de emamectin 50 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ:

granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:

clasa de periculozitate – III/I

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:

Nr. 20-06-11-01-0694 din 11.06.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Proclein 5 WG este un insecticid de origine naturală, obținut prin fermentație, pe bază de benzoat de emamectin, care aparține grupei chimice avermectine. Acționează prin blocarea transmiterii semnalelor nervoase ale insectei, ce traversează canalele de clor de la nivelul mușchilor. Insecta își încetează imediat hrănirea, paralizează ireversibil și moare într-un timp relativ scurt.

PROPRIETĂȚI:

- Este un insecticid sistemic (translaminar sau penetrant), care combate un număr mare de lepidoptere (omizi, molii, viermi, etc) din pomicultură.
- Datorită formei preparative inovatoare, asigură eficiență sporită, acțiune rapidă și protecție pe termen lung al plantelor de la penetrare.
- Efect ovicid (dacă lucrările se efectuează în faza «cap negru»).
- Eficiență ridicată în toate condițiile meteorologice: cât la

temperaturi ridicate (mai mari de +35° C), la fel și la precipitații abundente.

- Perioada scurtă de așteptare până la recoltare.

AVANTAJE:

- Eficacitate de lungă durată.
- Stabil în contactul cu razele solare.
- Rezistent la spălări de precipitații.
- Non-fitotoxic pentru plantele cultivate, nu provoacă stres, nu afectează aspectul comercial al producției.
- Inofensiv pentru entomofauna utilă peste 2-24 ore de la aplicare.
- Este compatibil cu alte produse de uz fitosanitar.
- Norma de consum mica.
- Este un aliat de nădejde cu alte insecticide din grupe chimice diferite.

COMPATIBILITATEA:

Este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar, totuși pentru orice combinații se va face în prealabil un test de compatibilitate

ATENȚIE! Proclein 5 WG nu se aplică pe plante în timpul înfloriturii fiind toxic pentru albine. Se recomandă cosiri repetate în livadă pentru distrugerea buruienilor înflorite.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Viermele merelor Molii tortricide	0,5 - 0,7	7 (2-3)	7 (3)
Prun	Viermele prunelor Molii tortricide			
Rapiță	Molia verzei Albilita rapiței Albilita verzei	0,5	28 (2)	- (3)

Norma de consum a soluției de lucru: măr, prun: 800-1500 l/ha;
rapiță: 300-400 l/ha.



tate fizico-chimică și efectuați un test pe cultura respectivă. Nu este compatibil cu pesticide cu reacție alcalină (preparate pe bază de sulf și zeamă bordelează) și uleiuri minerale. A nu se utiliza în combinații cu produsele pe bază de clorotalonil

și fosetil de aluminiu, și fertilizanți minerali lichizi.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- Aplicarea tratamentelor se recomandă a se executa dimineața sau seara când temperatura este moderată (25° C) sau scăzută.
- Tratamentele se încep la apariția primelor larve din ou înaintea inițierii penetrării în fructe.
- Produsul se aplică prin stropire cu echipamente terestre cu volumul necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției.



INSECTICIDE





INSECTICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: clorantraniliprol 200 g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr: 24-02-15-01-1507 din 15.02.2024

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Rapigen 20 SC este un insecticid cu acțiune sistemică locală și translaminară ce activează receptorii rianodinei, stimulând eliberarea ionilor de Ca^{++} din depozitele interne ale mușchilor netezi și striati ai insectei, ce determină paralizia mușchilor, controlul defecuos al mișcărilor, letargie generală și, în final, moartea dăunătorului. Acționează prin ingestie și absorbție cuticulară, inhibarea hrănirii insectei survine rapid, de la câteva minute până la câteva ore după ingerare. Dăunătorul afectat de produs devine imobil și dezorientat ceea ce determină căderea lui de pe frunze, caracteristic pentru o protecție excelentă a culturii. Activitatea ovi-larvicidă este determinată de absorbția produsului prin corion și, ulterior, pe cale orală, larva neonată ingerând corionul în momentul ecloziunii. În acest stadiu, larva ingeră o doză suficientă de produs, astfel încât să înceteze rapid hrănirea și să moară înainte de ecloziune. Moartea larvară survine într-un interval de timp de 24-72 ore, după procesul inițial de ingerare/absorbție. Larvele afectate regurgitează și pot rămâne lipite de frunze una sau mai multe zile fără să provoace pagube.

AVANTAJE:

- Insecticid din gama Rynaxypyr® - cu moleculă unică din clasa antranilamide, cu spectru larg de combatere asupra mai multor specii de dăunători din ordinul Lepidoptera și Coleoptera.
- Recomandat pentru folosirea în programele de combatere integrată (IPM-Integrated Pest Management) și programele de combaterea rezistenței dăunătorilor (IRM-Insecticide Resistance Management).
- Insecticid cu mod de acțiune diferit de al celorlalte insecticide cunoscute.
- Profil toxicologic și ecotoxicologic favorabil, sigur pentru om și mediul înconjurător.
- Rezistent la spălare - ploaia căzută la 2 ore după tratament nu diminuează eficacitatea produsului.
- Eficient și de lungă durată (14 - 21 zile).
- Protecție excelentă a culturii, acționează rapid asupra ouălor, larvelor și adulților.

COMPATIBILITATEA:

Este compatibil cu fungicidele, insecticidele, erbicidele și fertilizantii foliari utilizați în mod curent la culturile pentru care a fost omologat.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Viermele merelor Molia verde Molia frunzelor și peliței fructelor Molia cojii fructelor	0,25 - 0,3	21 (2)	7 (3)
Prun	Viermele prunelor	0,175		
Vița de vie	Molia verde a strugurilor Molia brună a strugurilor	0,15 - 0,25	30 (1)	
Piersic, cais	Molia orientală a fructelor	0,15 - 0,175	14 (2)	
Cartof	Gândacul din Colorado	0,1 - 0,15		
Tomate	Gândacul din Colorado Buha fructificațiilor	0,1 - 0,125	7 (1-2)	
Porumb	Sfredelitorul porumbului Buha fructificațiilor Buha semănăturilor	0,15 - 0,2	55 (2)	

Norma de consum a soluției de lucru: livezi: 1000-1500 l/ha;
vița de vie: 800-1000 l/ha;
tomate, cartof: 200-400 l/ha;
porumb: 300-800 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Produsul se aplică prin stropire cu echipamente terestre cu volumul necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției.
- Tratamentele se efectuează în zile fără vânt și în timpul orelor răcoase ale zilei.
- Folosirea capcanelor cu feromoni ajută la stabilirea momentului optim de aplicare.
- Pentru eficacitate maximă: aplicarea insecticidului la începutul depunerii pontelor, sau cel târziu pe pontele depuse.
- Măr - se aplică la avertizare, de la stadiul înfloririi până la începutul coacerii (BBCH 70-87).
- Prun - se aplică la avertizare, de la stadiul înfloririi până la începutul coacerii (BBCH 70-87).
- Tomate - se aplică de la apariția primelor ouă, înainte de eclozare (BBCH 51-89).



INSECTICIDE



Runerr® 24 SC



INSECTICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: metoxifenoizid 240 g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 21-12-22-01-1012 din 22.12.2021

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Runerr 24 SC este reprezentantul celei de-a doua generații de insecticide pentru lepidoptere care imită modul de acțiune al hormonului ecdysone - hormonul năpârlirii. Produsul accelerează năpârlirea prematură a larvelor, fapt care le cauzează moartea. La câteva ore după ingestia produsului, larvele încetează hrănirea, nu se mai deplasează, iar după 1-2 zile mor din lipsa de apă și hrană. Larvele care au fost expuse unei doze insuficiente mor adesea în stadiul de pupă sau evoluează ca adulți sterili.

PROPRIETĂȚI:

- Acționează asupra larvelor de lepidoptere (omizi, viermi) în principal prin ingestie, dar și prin contact.
- Acționează asupra tuturor vârștelor larvare de lepidoptere (are cea mai ridicată eficacitate începând de la ou și până la larve de vârstă a II-a).
- Are efect rezidual (protejează cultura) de 14-21 zile, în funcție

de doza aplicată și de viteza de creștere a plantelor (frunzelor, fructelor).

AVANTAJE:

- Nu este spălat de ploaie la 6 ore de la aplicare.
- Nu există rezistență încrucișată cu piretroizi, organofosforice și alte grupe de insecticide, deci poate fi folosit cu succes în programele de combatere a dăunătorilor.
- Produsul este unul prietenos cu mediul, cu toxicitate redusă pentru entomofauna utilă.
- Nu este fitotoxic pentru plantele cultivate, nu provoacă stres, nu afectează aspectul comercial al producției.

COMPATIBILITATEA:

Poate fi combinat cu fungicide, erbicide, insecticide, fertilizanți lichizi și regulatori de creștere, respectând recomandările de pe eticheta produselor. Pentru o mai bună siguranță, se vor consulta listele de compatibilități și se va face un test practic.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Viermele merelor Molii tortricide	0,5 - 0,75	14 (2)	7 (3)
Prun	Viermele prunului Molii tortricide			

Norma de consum a soluției de lucru: 800-1000 l/ha.



TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- La efectuarea tratamentului se va urmări turbionarea frunzișului pentru o mai bună acoperire cu insecticid, întrucât produsul trebuie ingerat neapărat de către larve pentru a se obține eficacitatea scontată.
- Deoarece insecticidul își exercită efectul fitotoxic în primul rând prin ingestie, este foarte important ca momentul aplicării tra-

tamentului să fie corelat cu momentul începerii hrănirii larvelor din specia respectivă, astfel:

- În cazul larvelor lepidoptere - defoliatoare - stropirea se va face când larvele încep să se hrănească.
- În cazul larvelor viermele merelor și respectiv viermele prunului - se recomandă aplicarea tratamentului cu puțin timp înainte de eclozarea ouălor, respectiv înainte ca larvele dăunătoare să pătrundă în fructe.



INSECTICIDE



Tepechi 50 WG

INSECTICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: flonicamid 500 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ:
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – IV/III

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-11-21-01-2015 din 21.11.2025

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Tepechi 50 WG este un aficid specific, utilizat pentru combaterea afidelor și musculiței albe din culturile legumicole și horticole. Are acțiune sistemică și translaminară, pătrunde în plante prin frunze, lăstari și circulă acropetal. Poate fi absorbit și din sol de către sistemul radicular ale plantei. Asupra insectelor daunătoare acționează prin contact și ingestie, determinând inhibarea hrănirii și moartea prin inanție (foame). **Tepechi 50 WG** acționează atât asupra afidelor imature cât și a celor adulte, iar eficacitatea sa nu este influențată de temperaturile din momentul aplicării și de intensitatea luminoasă.

PROPRIETĂȚI:

- Flonicamid-ul este un inhibitor de hrănire (stoparea proceselor de hrănire).
- Are o acțiune mai bună prin ingestie decât prin contact.
- Afidele trebuie să se hrănească cu părțile plantelor tratate cu Tepechi 50 WG pentru a absorbi ingredientul activ. Hrănirea înce-

tează în decurs de 1 oră, iar mortalitatea apare în decurs de 2-5 zile.

AVANTAJE:

- Tepechi 50 WG este un aficid specific care controlează toate speciile de afide.
- Are mișcare translaminară și sistemică în interiorul plantei pentru a ajunge la noi creșteri și la partea inferioară a frunzelor.
- Economic: un singur tratament garantează protecție de lungă durată (până la 28 de zile).
- Insecticidul Tepechi 50 WG este rezistent la ploaie, după 3 ore de la aplicare.
- Eficacitatea nu este redusă de temperaturi ridicate sau de intensitatea mare a luminii.
- Risc redus pentru insectele benefice, ideal pentru gestionarea integrată a dăunătorilor (IPM).
- Compatibilitate excelentă cu majoritatea pesticidelor.

COMPATIBILITATEA:

Nu se recomandă utilizarea amestecurilor în rezervor cu preparate pu-

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Păducele verde al mărului Păducele roz galic al mărului Păducele lănos al mărului	0,1 - 0,14	21 (2-3)	7 (3)
Cireș	Păducele negru al cireșului		14 (2)	
Piersic	Afide		14 (2)	
Varză	Păducele cenușiu al verzei Musculița albă a verzei Tripsul tutunului	0,12 - 0,14	21 (2)	
Ardei	Musculița albă de seră Tripsul tutunului Păducele verde al piersicului		7 (2)	
Mazăre	Păducele verde al mazării	0,14	14 (1)	

Norma de consum a soluției de lucru: măr, cireș, prun: 1000-1500 l/ha;
ardei, varză, mazăre: 200-400 l/ha.

ternic alcaline, precum și cu compuși de cupru și calciu. Înainte de utilizarea oricărui amestec este recomandat să se facă un test de compatibilitate fizico-chimică și efectuarea unui test pe cultura respectivă.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.

- Se vor aplica tratamente la avertizare, la apariția adulților și a larvelor sau la depășirea pragului economic de dăunare în funcție de dăunător.
- Produsul se aplică prin stropire cu echipamente terestre cu volumul necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției.



INSECTICIDE



FORMA PREPARATIVĂ:
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – III/I

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 20-06-11-01-0695 din 11.06.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Zenin 25 SC este un insecticid pir-etroid, cu o puternică acțiune de contact și ingestie asupra adulților și larvelor unei game largi de dăunători. După aplicare, substanța activă penetrează rapid cuticula insectei acționând asupra sistemului nervos, dăunătorul încetează să se hrănească, după care paralizază și mor repede.

AVANTAJE:

- Acțiune pronunțată prin contact și ingestie asupra dăunătorilor.
- Acționează rapid, total și ireversibil.
- Nu este fitotoxic în dozele recomandate la culturile omologate.
- Se utilizează în doze mici.
- Avantajos din punct de vedere economic.
- Compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar omologate la cultura dată.
- Insecticid non-sistemic cu efect rezidual bun pe suprafața tratată.

- Preparatul posedă rezistență maximă la acțiunea razelor UV și precipitațiilor cu condiția ca soluția să fie uscată înainte de a începe să plouă.

INDICAȚII DE UTILIZARE:

Se va evita aplicarea la temperaturile ridicate din timpul zilei, când dăunătorii sunt puțin expuși și fotodegradarea este intensă.



ATENȚIE! Se impune respectarea măsurilor de protecție față de albine și zoofagi. Pentru a proteja albinele și alte insecte polenizatoare nu aplicați pe plante în timpul înfloriturii. Nu utilizați produsul în timpul sezonului activ al albinelor.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Viespea cu ferestrău Molii tortricide Viermele merelor	0,2 - 0,25	20 (1-2)	10 (4)
Prun	Viespea semințelor de prun Viespi Viermele prunelor	0,2		7 (3)
Cais	Molia orientală Molia vărgată a fructelor	0,12 - 0,15	7 (1-2)	7 (4)
Rapiță	Gândacul lucios al rapiței Gărgărița tulpinilor de varză Păduchele cenușiu al verzei	0,08 - 0,1	30 (1-2)	- (3)
Grâu	Tripsul grâului Gândacul ovăzului Păduchele verde al cerealelor Ploșnițe	0,1	30 (1)	

Norma de consum a soluției de lucru: măr, prun, cais: 1000-1500 l/ha;
rapiță, grâu: 200-400 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- Tratamentul nu se va efectua în condiții de stres termic.
- De folosit un volum necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției de lucru.

Azoxin® 25 SC

FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: azoxistrobin 250 g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – III/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 21-12-22-02-1016 din 22.12.2021

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Azoxin 25 SC este un fungicid sistemic pe bază de azoxistrobin, din familia strobilurinelor. Azoxistrobin acționează ca inhibitor al respirației mitocondriale, blocând ciclul energetic al agenților patogeni. Intervine în ciclu biologic al ciupercii, în principal în timpul germinăției sporilor și în timpul inițierii penetrării în țesuturile plantei.

PROPRIETĂȚI:

- Este un fungicid modern cu spectru larg de acțiune, care influențează pozitiv activitatea fiziologică a plantei.
- Prezintă mișcare sistemică locală în plantă distribuindu-se uniform în frunze. Produsul este absorbit de frunze și lăstari. O parte din substanța activă este distribuită translaminar în plantă, iar altă parte este depozitată în stratul de ceară a frunzelor. Odată cu apariția umidității substanța activă depozitată este eliberată, astfel acțiunea produsului este



de lungă durată și protejează noile creșteri.

- Cel mai mare avantaj este dat de efectul vitalizant asupra plantelor "green effect", ce previne îmbătrânirea frunzelor. „Green effect”-ul duce la sporuri de producție și la o calitate superioară a strugurilor.

AVANTAJE:

- Fungicid cu un nou mecanism de acțiune ce acționează asupra unui spectru larg de boli.
- Acțiune preventivă, curativă și eradicativă.
- Oferă protecție durabilă contra patogenilor.
- Accelerează fotosinteza din frunze, ceea ce crește rezistența plantelor la condițiile meteorologice.

ATENȚIE! Azoxistrobinul este fitotoxic pentru unele soiuri de măr.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Vița de vie	Mana Făinare	0,6 - 0,8	21 (2-3)	7 (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 600-800 l/ha.

- Rezistență la spălare.
- În dozele recomandate nu posedă acțiune fitotoxică.

COMPATIBILITATEA:

Este compatibil cu majoritatea insecticidelor și fungicidelor, cât și cu îngrășăminte foliare făcând excepție cele cu reacție alcalină (de ex: Zeama Bordeleză). Pentru siguranță, în fiecare caz se va face în prealabil un test de compatibilitate fizico-chimică și efectuați un test pe cultură.

TEHNICA DE APLICARE:


- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- Se va folosi un volum de soluție suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului.
- Se va evita șiroirea.
- Nu tratați pe suprafața umedă sau atunci când se așteaptă precipitații în 2-2,5 ore după pulverizare. Dacă precipitațiile apar în mod neașteptat, strugurii trebuie pulverizați din nou.

- Se recomandă utilizarea preventivă înainte de instalarea infecției și apariția simptomelor.
- În cazul dezvoltării epifitotice a făinării viței de vie, eficacitatea preparatului este insuficientă și se recomandă de a combina cu un fungicid din grupa triazolilor.
- Nu poate fi utilizat pe timp cald. Cel mai bun moment pentru pulverizare este dimineata sau seara, altfel substanța se va evapora sub influența razelor solare, iar efectul dorit nu va avea loc.
- Intervalul dintre tratamente este de 10 zile în condiții de presiune scăzută și de 7-8 zile în caz de presiune ridicată de infecție.



FUNGICIDE





CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-11-21-02-2021 din 21.11.2025

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Bercus WG este un fungicid inovator, cu o combinație unică de două substanțe active, cu moduri de acțiune diferite: boscalid - din grupa carboxamide și piraclostrobin - din grupa strobilurine. Substanța activă predominantă, Boscalid-ul, acționează prin distribuție translaminară și mișcare acropetală în timp ce Piraclostrobin-ul se caracterizează prin difuzie local sistemică și



mișcare translaminară. În acest mod formează depozite puternic legate de cuticula frunzei și eliberează substanța activă treptat. Bercus WG acționează prin inhibarea germinăției sporilor și creșterii tubului germinativ, dar și asupra sporulării. Modul diferit de acțiune a substanțelor active, împreună cu efectul complementar al acestora determină obținerea unui spectru de combatere foarte larg împotriva agenților patogeni. Aplicarea timpurie, cu precădere preventivă, determină o eficacitate excelentă împotriva patogenilor.

PROPRIETĂȚI:

- Produsul acționează rapid, cu o eficacitate înaltă contra bolilor.
- Oferă performanțe sigure, ce conduc la producții de calitate mai bună și implicit la un profit crescut.
- Garantează o protecție îndelungată, datorită eliberării lente și continue a substanțelor active din depozitele miniaturale de pe frunze.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Făinare Monilioză	0,7 - 0,8	15 (2-3)	7 (3)
Prun	Monilioză	0,75 - 1,0	10 (2)	

Norma de consum a soluției de lucru: 1000-1500 l/ha.



AVANTAJE:

- Atac dublu asupra ciupercii, cu protecție excelentă a culturilor și siguranță.
- Vitalitate extinsă a culturii, menținând-o mai puternică și frunzele mai verzi.
- Acțiune protectoare, preventivă și curativă.
- Oferă protecție împotriva infecțiilor și ajută la combaterea bolilor deja stabilite.
- Spectru larg de acțiune: eficient împotriva unui număr mare de patogeni fungici.
- Rezultate deosebite în prevenirea apariției bolilor de depozit.

- Excelent în managementul rezistenței grație celor 2 substanțe active cu moduri diferite de acțiune.
- Îmbunătățește calitatea culturii, ajută la obținerea unor recolte mai bogate și de o calitate mai bună.
- Produs inofensiv pentru albine.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Folosirea alternativă de produse din clase chimice diferite.
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- De folosit un volum necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției de lucru.
- Aplicarea preventivă a tratamentelor.
- Împotriva făinării, din stadiul de buton roz și până la începutul colorării fructelor.
- Pentru combaterea bolilor de depozit, în perioada de dinainte de recoltare, cu respectarea timpului minim de pauză de 7 zile.





FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: boscalid 500 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ:
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-11-21-02-2019 din 21.11.2025



MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Boscad 50 WG este un fungicid sistemic pe bază de boscalid, din grupa carboxamide, folosit pentru a combate putregaiul cenușiu la vița de vie și monilioza la cais, cireș și prun. Substanța activă boscalid acționează asupra complexului II al ciclului Krebs al agentului patogen, ducând la stoparea producerii de energie în celule. Boscad 50 WG determină inhibarea germinării sporilor și a formării tubului germinativ, dar și apariția apăsorilor și a elementelor de penetrare. Aceste

efecte duc concret la blocarea metabolismului patogenului. Produsul are efect multi-site, reducând la minim posibilitatea de apariție a formelor de rezistență.

PROPRIETĂȚI:

Boscalid-ul, substanța activă din Boscad 50 WG, prezintă proprietăți de hidrosolubilitate și liposolubilitate medie. Acestea sunt condiții importante ce fac din boscalid o substanță sistemică ce permite pătrunderea și mobilitatea sa în plantă. După aplicare, o parte din

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Cais, cireș	Monilioze	0,4 - 0,5	7 (2-3)	7 (3)
Prun			7 (2)	
Vița de vie	Putregai cenușiu	1,0 - 1,2	21 (1)	

Norma de consum a soluției de lucru: 1000-1500 l/ha.

substanță rămâne pe suprafața plantei și o protejează de germenii sporilor purtați de aer. O altă parte din substanța activă este preluată de plantă și stocată translaminar, pătrunzând în țesuturi. O parte din substanța activă absorbită este transportată sistemic prin intermediul sevei în direcția vârfului frunzei, respectiv la periferia frunzei.

AVANTAJE:

- Acțiune preventivă și curativă.
- Acoperire translaminară extinsă pe frunză.
- Perioadă lungă de protecție.
- Permeabilitate puternică.
- Acțiunea produsului se reflectă și asupra formelor rezistente ale ciupercii.
- Se poate de utilizat în sistemele integrate de protecție.
- Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de protecție a plantelor. Înainte de utilizare este recomandat să se facă un test de compatibilitate.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- De folosit un volum necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj și a părților mai puțin expuse ale butucilor de vie (mai ales partea inferioară și ciorchinii).
- Se recomandă de utilizat produsul în scop profilactic.
- Termenul optimal de utilizare a fungicidului Boscad 50 WG, contra putregaiului cenușiu - faza înainte de pârgă.





FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: oxiclорură de cupru 400 g/kg
+ metalaxil-M 50 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ:
pulbere umectabilă (WP)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 21-12-22-02-1021 din 22.12.2021

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Cooper-M 45 WP este un fungicid combinat, cu dublă acțiune sistemică și de contact, pe bază de metalaxil-M și oxiclорură de cupru. Oxiclорura de cupru (componenta de contact), prin acțiune preventivă, conferă protecție împotriva noilor infecții prin formarea unui strat protector pe suprafața plantei. Metalaxil-M (componenta sistemică), este preluat rapid de părțile verzi ale plantei și prin xilem se răspândește în întreaga plantă și inhibă sinteza proteinelor



și suprimă astfel dezvoltarea ciupercilor.

PROPRIETĂȚI:

- Datorită prezenței celor două componente, posedă o acțiune profilactică, curativă și antispোরulantă.
- Asigură intervale mai lungi între stropiri în comparație cu fungicidele de contact.
- Cele două substanțe active sunt complementare și sinergice, iar prin combinarea lor într-un singur produs se asigură lărgirea la maxim a spectrului de combatere, reducerea dozelor de substanță activă folosite și prevenirea instalării rezistenței patogenilor.

AVANTAJE:

- Translocare în punctele de creștere.
- Rămâne mult timp activ pe suprafața foliară.
- Reactivarea produsului prin rouă, ploaie sau irigare.
- Spor cantitativ și calitativ de producție.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Vița de vie	Mana	2,0 - 2,5	28 (3)	7 (3)
Cartof	Mana Alternarioza			

Norma de consum a soluției de lucru: vița de vie: 600-800 l/ha;
cartof: 300-400 l/ha.



COMPATIBILITATEA:

Este compatibil cu majoritatea insecto-fungicidelor, cu excepția celor care au o reacție alcalină. Nu utilizați concomitent cu emulsii concentrate (EC), preparate pe bază de fosetil de aluminiu. Pentru siguranță, în fiecare caz se va face în prealabil un test de compatibilitate fizico-chimică și efectuați un test pe cultură.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- De folosit un volum necesar de soluție, astfel încât să se asigure

o acoperire uniformă a întregului foliaj, inclusiv a părților mai puțin expuse ale butucilor de vie (mai ales partea inferioară și ciorchinii).

- Eficacitatea cea mai bună se obține când tratamentele se aplică preventiv, înainte de sau la apariția primelor simptome de infecție.
- Intervalul dintre tratamente variază, de la 7 până la 14 zile, adaptându-se în funcție de condițiile climatice și a presiunii de infecție.
- De efectuat tratamentele la temperatura cuprinsă între +15° C și +25° C.



FUNGICIDE



FORMA PREPARATIVĂ:
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-04-15-02-1888 din 15.04.2025

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Delin 70 WG este fungicid cu acțiune de contact și preventivă. Perturbează sporii agenților patogeni la etapa de germinare.

PROPRIETĂȚI:

- Fungicid cu efect multi-site în combaterea superioară a rapănului la măr.
- Substanța activă ditianon are efect preventiv fiind una dintre cele mai active substanțe din categoria fungicidelor de contact.

AVANTAJE:

- Asigură o calitate înaltă a produsului finit și păstrării lui.
- Posibilitatea de aplicare în toate fazele de dezvoltare a culturii.
- Nu este fitotoxic la culturile tratate.
- Risc redus de rezistență.
- Substanța activă ditianon în apă nu se dizolvă complet, o parte a substanței active la prezența picăturilor de apă(ploaie, ceață, rouă) continuă să se dizolve și

astfel se lungeste acțiunea preparatului.

- După prelucrare pe plante se formează o pătură impermeabilă care împiedică pătrunderea infecției în plante.
- Manifestă un bun efect curativ în tratarea leziunilor mecanice provocate de precipitațiile cu grindină, prin aplicarea a două tratamente consecutive cu concentrația de 0.1% a fungicidului la un interval de 7 zile.
- Inofensiv pentru albiși și entomofagi.



ATENȚIE! Nu se va amesteca în soluția de lucru, preparate cu reacție alcalină (spre ex.: zeamă bordelează) și cele cu conținut de ulei!

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn	0,7 - 1,0	30 (2-3)	7 (3)
Cireș	Clasterosporioza Monilioze Cocomicoză		21 (2-3)	
Prun 	Pătarea roșie Clasterosporioza		În proces de extindere	
Cais 	Bășicarea frunzelor Clasterosporioza			
Piersic 	Clasterosporioza Monilioze			

Norma de consum a soluției de lucru: 1000-1500 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- De folosit un volum necesar de soluție, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului

foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al soluției de lucru.

- Intervalul între tratamente 7-10 zile, în cazul căderii precipitațiilor mai mult de 25 mm, intervalul între tratamente se micșorează.

■ Produs în proces de extindere



FUNGICIDE

Efalin® 80 WP



FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: fosetil de aluminiu 800 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ:
pulbere umectabilă (WP)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-04-15-02-1891 din 25.04.2025

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Efalin 80 WP are acțiune preventivă și curativă prin inhibarea germinăției sporilor și de blocare a dezvoltării miceliului în plantă.

PROPRIETĂȚI:

- Prezintă o proprietate unică de stimulare a sistemelor de auto-apărare a plantelor și nu dezvoltă fenomen de rezistență.
- Manifestă acțiune sistemică și translaminară în plantă.
- Are acțiune preventivă și curativă asupra patogenilor.
- Produsul se remarcă printr-o

mobilitate foarte mare în toate țesuturile plantei.

AVANTAJE:

- Foarte bine tolerat de culturile agricole în diferite faze de dezvoltare și poate fi utilizat și în timpul înfloririi.
- Odată pătruns în plantă, se distribuie ascendent și descendent permițând astfel protejarea organelor vegetative și fructifere într-o perioadă lungă de timp.
- Intensifică imunitatea plantelor împotriva pătrunderii infecției în celule.



ATENȚIE! Incompatibil cu îngrășămintele foliare care conțin azot și nutritienți pentru plante, cât și cu produsele pe bază de cupru, dicofol și pirimetanil. Efalin WP 80 nu trebuie amestecat sau aplicat cu formulări uleioase și substanțe tensioactive. Formarea unui strat de ulei pe frunziș, împiedică pătrunderea acestuia în plantă. Pentru o mai mare siguranță testați compatibilitatea și fitotoxicitatea produselor înainte de utilizare.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn Fitoftoroză Bacterioze	5,0	30 (2)	7 (3)
Vița de vie	Mana	3,0 - 3,5	30 (3)	

Norma de consum a soluției de lucru: măr: 800-1000 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- Oferiți o bună acoperire a plantelor.
- Momentul optim de aplicare al acestui fungicid la măr, pentru combaterea focului bacterian al rozaceelor, este în fenofaza buton roz - începutul înfloritului până la scuturarea petalelor, pentru a preveni infecția care are loc prin stigmatul florii.
- De utilizat volumul de soluție maximal și doza maximă a preparatului.



FUNGICIDE



Flint Stars® SC



FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: pirimetanil 400 g/l
+ trifloxistrobin 120 g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – III/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 20-12-17-02-0856 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Flint Stars SC este un fungicid cu acțiune sistemică, complex, care conține două substanțe active: pirimetanil și trifloxistrobin, cu mecanisme de acțiune diferite.

Pirimetanil - care acționează prin inhibarea capacității ciupercii de a produce enzime necesare procesului de infecție. Drept urmare are loc stoparea creșterii tubului de germinație și a miceliului.

Trifloxistrobin - substanța activă mesosistemică ce se caracterizează printr-o aderență foarte bună cu stratul ceros al frunzei, urmat de redistribuirea prin faza de va-

pori și redepunerea pe organele verzi noi formate. Ciclul de dezvoltare a ciupercilor este întrerupt încă din stadiile primare prin inhibarea germinației sporilor.

AVANTAJE:

- Fungicid sistemic, mezosistemic combinat din două substanțe active cu un spectru larg de acțiune.
- Eficiență excepțională datorită a două mecanisme diferite de acțiune complementare una cu alta.
- Efect protector, curativ și anti-sporulant.
- Rezistență la ploaie și performanță la temperaturi scăzute.
- Redistribuirea completă a fungicidului prin acțiune sistemică și faza gazoasă.
- Excelent pentru utilizare în programe anti-rezistență.
- Aplicare flexibilă cu posibilitatea de a prelungi intervalul dintre tratamente.
- Inofensiv pentru albiși și fauna utilă.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Făinare Rapăn	0,5 - 0,7	35 (2-3)	7 (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 800-1000 l/ha.

COMPATIBILITATEA:

Flint Stars SC este compatibil cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor. Nu utilizați fungicidul în amestec cu produse care conțin aluminiu. Pentru siguranță, în fiecare caz se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau înainte de 2-4 ore de ploaie.
- Aplicați un volum necesar de soluție, astfel încât să asigurați o acoperire uniformă a întregului foliaj.
- Evitați punctul de scurgere al soluției.

- Asigurați funcționarea agitatorului pe toată durata tratamentului.



FUNGICIDE



CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 22-12-22-02-1190 din 22.12.2022

FORMA PREPARATIVĂ:
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – IV/IV

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Folipec 80 WG are la bază folpet, un fungicid preventiv aparținând clasei ftalimidelor. Substanța activă folpet are acțiune preventivă de contact, împiedicând instalarea infecțiilor la suprafața organelor tratate prin blocarea respirației și diviziunii celulare ciupercilor sensibile. Inhibă multe dintre enzimele și carboxilazele cu acțiune oxidantă și de sinteză a citratului.

AVANTAJE:

- Având acțiune multi-site, prin aplicarea produsului se previne apariția rezistenței patogenilor la aplicarea fungicidelor.
- Partener de neînlocuit pentru fungicidele sistemice.
- Aderența sporită determină stabilitatea în condiții meteo nefavorabile ale timpului.
- Este un component important în sistemele integrate de protecție a plantelor.
- Poate fi utilizat de-a lungul întregii perioade cu risc de atac.

- Formularea în microgranule dispersabile în apă garantează absența prafului, solubilitatea perfectă și miscibilitatea în rezervor.
- Folosit conform recomandărilor, poate fi aplicat fără riscuri de fitotoxicitate, având o selectivitate excelentă.
- Nu este toxic pentru albiși și păsări.

COMPATIBILITATEA:

Este compatibil cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor, cu excepția produselor cu reacție pu-



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn	1,5 - 2,0	21 (2-3)	7 (3)
Prun	Pătarea roșie Clasterosporioza		În proces de extindere	
Cireș	Clasterosporioza Cocomicoză			

Norma de consum a soluției de lucru: 1000-1500 l/ha.

ternic alcalină (preparate pe bază de sulf și zeamă bordelează). Nu este compatibil cu produsele uleioase. Pentru mai multă siguranță, se vor consulta tabelele de compatibilitate și se va face un test practic pe cultură.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Asigurați o acoperire uniformă întregului foliaj al pomilor.

- Se aplică în cursul întregii perioade de vegetație, la avertizare sau preventiv, în funcție de presiunea de infecție la interval de 7-10 zile.
- În fazele critice de infecție (ploi frecvente și nebulozitate), se recomandă combinarea produsului cu un fungicid sistemic (de ex: Norus 75 WG, Scorus 25 EC, Scalos 400 SC ș.a.)
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau cu 4-6 ore înainte de ploaie.

■ Produs în proces de extindere



FUNGICIDE



FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: ciprodinil 375 g/kg
+ fludioxonil 250 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ:
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 22-05-19-02-1093 din 19.05.2022

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Ciprodinil-ul blochează dezvoltarea miceliului și penetrarea lui în țesuturi. Are capacități sistemice și translaminare. **Fludioxonil**-ul are acțiune de contact și previne germinarea sporilor de infecție pe suprafața organelor tratate.

PROPRIETĂȚI:

- Risc scăzut de apariție a rezistenței.
- Combate rapănul mărului în fazele critice.
- Fungicidul are o acțiune dublă sistemică și de contact, recomandat preventiv și curativ.

- Rezistent la spălare.
- Eficacitatea preparatului nu depinde de temperatura aerului.

AVANTAJE:

- Este rapid absorbit de organele tratate.
- Activitatea produsului nu depinde de temperatura aerului.
- Micșorează efectiv infecția bolilor de depozit, măbind perioada de păstrare a producției.
- Nu face plasă pe fructe.
- Compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn	0,35 - 0,4	15 (2-3)	7 (3)
Vița de vie ■ (soiuri de masă)	Putregaiul cenușiu		În proces de extindere	

Norma de consum a soluției de lucru: măr: 800-1000 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau înainte de 2-4 ore de ploaie.
- Aplicați un volum necesar de soluție, astfel încât să asigurați o acoperire uniformă a întregului foliaj.
- Evitați punctul de scurgere al soluției.
- Asigurați funcționarea agitatorului pe toată durata tratamentului.



■ Produs în proces de extindere



FUNGICIDE



CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 20-01-23-02-0618 din 23.01.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Kapton 80 WG este un fungicid de contact cu acțiune preventivă și curativă. Substanța activă captan penetrează rapid în sporii ciupercilor susceptibile, împiedică germinarea acestora sau stopează creșterea tubului germinativ și penetrarea lui în țesuturile plantei, împiedicând astfel instalarea infecțiilor pe organele tratate. Mecanismul biochimic al substanței active se referă la blocarea respirației și diviziunii celulare a patogenilor.

AVANTAJE:

- Acțiune multi-site, împiedică apariția fenomenului de rezistență la patogen.
- Aderență sporită determinând stabilizarea în condiții meteo nefavorabile ale timpului.
- Este un component important în sistemele integrate de protecție a plantelor.
- În cazul epifitotiilor se utilizează în amestec cu produse din altă

FORMA PREPARATIVĂ:

granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:

clasa de periculozitate – IV/ IV

grupă chimică cu acțiune sistemică.

- Poate fi utilizat de-a lungul întregii perioade cu risc de atac.
- Prin aplicarea produsului înainte de recoltare se previne în mod eficient apariția bolilor de depozit.
- Produsul se dizolvă foarte bine în apă, ceea ce asigură distribuția lui uniformă pe organele tratate.
- În dozele recomandate nu posedă acțiune fitotoxică.
- Nu este toxic pentru albiși și păsări.

COMPATIBILITATEA:

Fungicidul este compatibil cu majoritatea insecticidelor și fungicidelor. Nu este compatibil cu produsele cu reacție puternic alcalină (preparate pe bază de sulf și zeamă bordeleză) și cu uleiuri minerale. Se recomandă să se facă un test fizioco-chimic pentru amestecul preconizat și efectuați un test pe cultura respectivă.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn	2,0 - 2,5	28 (2-3)	7 (3)
Prun	Pătarea roșie a frunzelor Clasterosporioza		21 (2-3)	
Cireș	Clasterosporioza Cocomicoză			
Cais	Clasterosporioza		În proces de extindere	
Piersic	Clasterosporioza Bășicarea frunzelor			
Cartof , tomate	Mana Alternarioza			
Vița de vie	Mana			

Norma de consum a soluției de lucru: livezi: 1000-1500 l/ha;
vița de vie: 800-1000 l/ha;
legume: 300-400 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Oferiți o acoperire bună a plantelor.
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau înainte de 4-6 ore de ploaie.
- Tratamentele se efectuează dimineața sau seara la temperaturi cuprinse între +15° C și +25° C.
- În zilele posomorâte tratamentele se pot efectua și în decursul zilei.

■ Produs în proces de extindere



FUNGICIDE

Kuprumacs® 840 DF

FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: oxiclorură de cupru 840 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ:
granule uniform dimensionate (DF)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – IV/III

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 20-12-17-02-0854 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

La contactul cu suprafața tratată, oxiclorura de cupru eliberează ioni de cupru activi care acționează prin coagularea proteinelor din țesuturile agentului patogen, care își pierde capacitatea de infectare și de germinare a sporilor prevenind infecția primară.

PROPRIETĂȚI:

- **Kuprumacs 840 DF** este un fungicid de contact pe bază de cupru, care asigură un efect protector preventiv asupra patogenilor.
- Acțiune anti-bacteriană eficientă contra focului bacterian al rozaceelor, bacterioze.
- Creează un strat protector care împiedică pătrunderea agenților patogeni în plantă. Cristalele de cupru metalic aderă la suprafața frunzelor tratate. În timpul contactului cu apa, ioni de cupru sunt eliberați și devin activi împotriva agenților patogeni țintă.
- Disponibil într-o formă modernă - granule dispersabile în apă, ușor de utilizat, manevrat și depozitat.

AVANTAJE:

- Nu produce fitotoxicitate - produs modern și performant.
- Bioactivitate sporită, dispersie bună și un control rezidual bun.
- Preparatul nu produce praf – lipsa unui impact negativ asupra muncitorilor.
- Se dizolvă ușor și repede în apă.
- Rezistență crescută la spălare și aderare rapidă pe suprafața frunzei.
- Nu creează rezistență și învinge formele rezistente apărute la fungicidele sistemice.
- Toxicitate scăzută (poate fi utilizat în producția ecologică).
- Eficient la temperaturi scăzute.
- Inofensiv pentru albi.

COMPATIBILITATEA:

Compatibil cu majoritatea insecto-fungicidelor folosite în mod curent în Moldova. Nu este compatibil cu soluțiile acide (pH mai mic de 5.5), precum și a preparatelor pe bază de fosil de aluminiu. Pentru siguranță în fiecare caz se va face în prealabil un test de compatibilitate fizico-chimică și efectuați un test pe cultura respectivă.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn	3,0	20 (2)	7 (3)
Prun	Pătarea roșie a frunzelor Clasterosporioza Monilioza		21 (2)	
Vița de vie	Mana Fomopsis Rujeola infecțioasă		30 (2-3)	
Cireș	Cocomicoză Clasterosporioza Monilioza	2,5 - 3,0	21 (2)	7 (3)
Cartof	Mana Alternarioza	2,5	20 (2)	
Căpșun	Pătarea albă Pătarea brună	2,2 - 2,5	14 (2)	

Norma de consum a soluției de lucru: măr, prun, cireș: 800-1000 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha;
cartof, căpșun: 200-400 l/ha.

Dacă se formează fulgi sau sedimente ca urmare a amestecării, preparatele nu pot fi utilizate simultan.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu se recomandă de efectuat tratamente la temperatura aerului peste 25° C sau în prezența excesului de umiditate pe plante.

- Folosiți un volum necesar de soluție, astfel încât să se asigure o bună acoperire uniformă a întregului foliaj. Evitați punctul de scurgere al soluției de lucru.
- La pomii fructiferi prima lucrare se aplică primăvara devreme, la ieșirea din repausul vegetativ, pentru combaterea formelor hibernante ale agenților patogeni.



FUNGICIDE



FORMA PREPARATIVĂ:
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – III/III

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-04-15-02-1893 din 15.04.2025

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Magnat 75 WG este absorbit de părțile aeriene ale plantei și distribuit acropetal în interiorul țesuturilor, unde blochează extinderea ciupercii prin inhibarea procesului de sinteză a ergosterolilor ceea ce duce la incapacitatea ciupercii de a-și forma perete celular.

AVANTAJE:

- Fungicid sistemic cu acțiune protectivă, curativă și eradicativă.
- Odată pătruns în plantă este translocat prin xilem în toate organele verzi ale plantei, inclusiv în lăstarii apăruiți după aplicarea tratamentului.
- Poate fi aplicat în toate fazele de dezvoltare a plantei, în condiții extreme se pot face tratamente chiar și în timpul înfloriturii fără a afecta polenizarea și calitatea fructelor.
- Stabil la precipitațiile atmosferice.

- „Stop-efect” pronunțat.
- Spectru larg de acțiune și eficacitate biologică înaltă.
- Inofensiv pentru albi.

COMPATIBILITATEA:

Produsul poate fi utilizat în amestec cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor și îngrășămintelor foliare, cu excepția celor cu reacție alcalină, acide și oxidante. Pentru o mai mare siguranță se va consulta lista de compatibilitate și se va face un test.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Făinarea	0,25 - 0,3	35 (2-3)	7 (3)
Vița de vie	Făinarea			
Prun	Clasterosporioza Pătarea roșie a frunzelor Monilioze		14 (1-3)	
Vișin, cireș	Clasterosporioza Monilioză Cocomicoză		20 (2-3)	
Piersic	Clasterosporioza Făinare		7 (2-3)	
Cais	Clasterosporioza	0,3 - 0,4	7 (1-3)	- (3)
Grâu	Făinare Helmintosporioze		35 (1)	
Rapiță	Putregai alb Fomoza Alternarioza		56 (1-2)	

Norma de consum a soluției de lucru: livezi: 1000-1500 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha;
grâu, rapiță: 200-400 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- De folosit un volum necesar de soluție astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a întregului foliaj și a părților mai puțin expuse ale butucilor de vie (mai ales partea inferioară și ciorchinii).
- Tratamentele se aplică preventiv sau la apariția primelor semne de infecție, intervalul între tratamente 7-10 zile.





FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: fluazinam 500 g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 20-12-17-02-0851 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Substanța activă fluazinam face parte dintr-o nouă clasă chimică - diarilamine, care se caracterizează printr-un risc scăzut de apariție a raselor rezistente. Mecanismul de acțiune a fluazinamului se bazează pe întreruperea producerii de energie în interiorul ciupercii, respectiv oprirea germinării sporilor și mobilitatea acestora.

PROPRIETĂȚI:

- Fungicid de contact cu efect antisporulant, ce stopează germinarea și mobilitatea sporilor.
- Are acțiune preventivă.
- Rezistent la precipitații.
- Eficacitate de lungă durată.
- Acțiune complexă - împiedică apariția formelor rezistente.
- Formulare lichidă, ușor de utilizat și de aplicat.

COMPATIBILITATEA:

Nanto 50 SC este în general compatibil cu majoritatea insecticidelor și fungicidelor, făcând excepție

cele cu reacție alcalină (preparate cuprice, sulfuri), incompatibil cu Dodina. Pentru siguranță, în fiecare caz se va face în prealabil un test de compatibilitate fizico-chimică și efectuați un test pe cultura respectivă.

FITOTOXICITATE:

Nu aplicați în amestecuri sau la intervale scurte de timp cu insecticide pe bază de abamectină, deoarece poate apărea fitotoxicitate. Folosit conform recomandărilor acestei etichete, nu este de așteptat să apară fitotoxicitate.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn	0,75	32 (2)	7 (3)
	Monilioze	1,25	32 (2)	7 (3)
Vița de vie	Mana		În proces de extindere	
Cartof, tomate	Mana, Alternarioza			

Norma de consum a soluției de lucru: măr: 800-1000 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha;
legume: 400-600 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau înainte de 4-6 ore de ploaie.
- Aplicați un volum necesar de soluție, astfel încât să asigurați o acoperire uniformă a întregului foliaj, evitați punctul de scurgere al soluției.
- Pentru obținerea unor efecte maxime de combatere la pomii fructiferi, se aplică tratamentul preventiv, imediat ce condițiile climaterice au atins parametrii necesari declanșării infecției.

- Produsul nu trebuie aplicat atunci când există condiții meteorologice precum: vânturi puternice, îngheț, temperaturi ridicate și stres hidric al plantelor.



■ Produs în proces de extindere



FUNGICIDE



MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Neo Super SC este un fungicid sistemic care are la bază două substanțe active cu acțiune complementară.

Protioconazol aparține clasei triazolilor și are un mecanism de acțiune tip DMI - inhibarea sintezei sterolului. Protioconazol are un efect sistemic important și asigură o protecție de lungă durată. Are acțiune preventivă și curativă asupra unei game largi de patogeni.

Trifloxistrobin - un compus din grupa chimică strobilurine, are acțiune preventivă și activitate mesostemică. Trifloxistrobin, grație activității mesostemice, este puternic absorbit de către stratul ceros al frunzelor, redistribuit pe suprafața foliară prin procesele de evapo-transpirație și deopotrivă în interiorul frunzelor datorită activității translaminare. El întrerupe ciclul de dezvoltare a ciupercii încă din stadiile primare, inhibând germinația sporilor, creșterea tubului germinativ și formarea apresorilor.

PROPRIETĂȚI:

- **Neo Super SC** posedă acțiune sistemică și translaminară, se distribuie uniform pe suprafața foliară protejându-le pe ambele părți de atacul agenților patogeni.
- Specific acestui produs este efectul de „green leaf” (menținerea foliajului verde o perioadă mai lungă de timp), ceea ce permite acumulări suplimentare în boabe, deci sporuri de producție.

AVANTAJE:

- Oprirea rapidă a dezvoltării bolilor și protecția pe termen lung a culturii.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Grâu	Rugina brună Septorioza Pirenoforoză	0,6 - 0,7	35 (2)	- (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 200-400 l/ha.



COMPATIBILITATEA:

Neo Super SC este compatibil cu majoritatea insecticidelor și fungicidelor, cu excepția celor foarte alcaline (pe bază de Cu sau sulf) și a celor foarte acide. Pentru siguranță în fiecare caz se va face în prealabil un test de compatibilitate fizico-chimică și efectuați un test pe cultura respectivă.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Tratamentele se efectuează în zile fără vânt și în timpul orelor răcoroase ale zilei.
- Tratamentele cu **Neo Super SC** se realizează preventiv sau curativ, la apariția primelor simptome.
- Primul tratament se efectuează de obicei în intervalul cuprins între sfârșitul înfrățitului și sfârșitul înspicatului.
- Tratamentul împotriva fuzariozei se efectuează în intervalul dintre sfârșitul înspicatului și sfârșitul înfloritului, utilizând doza de 0,7 l/ha.
- Soluție eficientă pentru combaterea fusariozei spicului.
- Prevenirea eficientă și controlul agenților patogeni prin mecanismul de acțiune multidirecțional.
- Posedă acțiune preventivă, curativă și eradicativă.
- Rezistență ridicată la factorii de stres.
- Adaptabilitate extraordinară la condițiile meteorologice.
- Component ideal de anti rezistență, eficient în sistemele integrate de protecție.
- Pătrunderea rapidă în plantă, rezistență la spălare de precipitații.





FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: bupirimat 250 g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
emulsie apoasă (ulei în apă) (EW)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – IV/-

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 22-12-22-02-1188 din 22.12.2022

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Nobel 25 EW este un fungicid sistemic cu acțiune preventivă și curativă, ce conține bupirimat, substanță activă din grupa pirimidinelor. Substanța activă bupirimat inhibă sporularea, germinarea sporilor, formarea de apresorii (organe de "ancoare"), formarea de haustori (organe penetrante) și



interferează negativ în creșterea miceliului.

AVANTAJE:

- Are mobilitate în plantă de tip citotrop și translaminar, ceea ce permite o ușoară dispunere în limbul frunzelor, protejând astfel vegetația în creștere.
- Mecanism unic de acțiune, diferite de cel al triazolilor, strobilurinelor sau SDHI-urilor.
- Indispensabil în strategii anti-rezistență.

COMPATIBILITATEA:

Nobel 25 EW poate fi compatibil cu multe dintre produsele de uz fitosanitar folosite în mod curent la cultura omologată, cu excepția produselor cu reacție puternic alcalină (zeamă bordelează), cu produse pe bază de dodină, uleiuri și polisulfide. Amestecurile vor fi utilizate imediat ce au fost preparate. Pentru orice combinații se va face în prealabil un test de compatibilitate fizico-chimică și un test pe

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Făinare	0,75 - 1,0	14 (4)	7 (3)
Vița de vie		0,8 - 1,5		

Norma de consum a soluției de lucru: măr: 800-1000 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha.



cultura dată, urmărind plantele tratate în termen de trei zile de la aplicare, pentru a determina aspectele fizice și reacțiile toxice.



FITOTOXICITATE:

Aplicat conform recomandărilor și în condiții normale de climă, produsul nu produce fenomene de fitotoxicitate. Produsul poate fi fitotoxic pentru soiurile de măr Gravenstein și Idared. În tratamentele post-înflorire la merii din soiurile sensibile la rapănul mărului, verificați selectivitatea la scară mică.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- A nu se utiliza în perioadă de căldură intensă, vânt și cu probabilitate mare de ploaie în următoarele 4-6 ore.
- Se folosește preventiv la apariția condițiilor favorabile de dezvoltare a agenților patogeni sau curativ pentru stoparea extinderii infecțiilor deja apărute.
- La vița de vie primul tratament se efectuează până la apariția primelor ciorchine. Următoarele tratamente se efectuează la un interval de 10-14 zile, în funcție de gradul de infecție.



FUNGICIDE



MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Nordox 750 WG este un fungicid-bactericid de contact pe bază de oxid de cupru, cu acțiune preventivă împotriva unei game largi de infecții fungice și boli bacteriene. La contactul cu suprafața tratată, oxidul de cupru eliberează ionii de cupru activi care acționează prin coagularea proteinelor din țesuturile agentului patogen, care își pierde capacitatea de infectare și de germinare a sporilor preve-

nind infecția primară. Preparatul are efect toxic multiplu și împiedică dezvoltarea rezistenței. Nordox 750 WG are funcția de eliberare lentă controlată a ionilor de cupru, permițând plantelor să rămână protejate pentru o perioadă mai lungă de timp.

AVANTAJE:

- **Nordox 750 WG - fungicidul cu cel mai mare conținut de cupru metalic.** 75% din compoziția



preparatului Nordox 750 WG este cupru pur biologic activ.

- **Fitotoxicitate redusă:** În dozele recomandate, folosirea preparatului controlează efectiv infecțiile fungice și bacteriene.
- **Cel mai bun produs cupric de pe piață:** Eficacitatea fungicidelor pe bază de cupru poate fi mult îmbunătățită prin reducerea dimensiunii particulelor. Nordox 750 WG are cele mai mici dimensiuni ale particulelor de oxid de cupru, care sunt de aproximativ 1,2 microni. Datorită dimensiunii mici a particulelor, produsul rămâne eficient chiar și în condiții de precipitații abundente.
- **Aderență ridicată pe plante:** Distribuție uniformă pe toată suprafața.
- **Norme mici de utilizare:** Datorită faptului că Nordox 750 WG este compus din 75 % cupru pur (cel mai concentrat produs de pe piață), preparatul are norme

mici de utilizare și necesită un număr mai mic de aplicări.

- **Perioadă îndelungată de protecție:** Produsul posedă proprietatea de emanare lentă a ionilor de cupru, ce permite plantelor să fie protejate pe o perioadă îndelungată de timp: 1-2 săptămâni (în dependență de condițiile meteo).
- **Preparat universal:** Se utilizează la diferite culturi: sămânțoase, sămburoase, vița de vie, culturi de câmp, legume și culturi în spațiul protejat.

COMPATIBILITATEA:

Nordox 750 WG este compatibil cu majoritatea fungicidelor și insecticidelor. Nu este compatibil cu produse ce conțin aluminiu, pirimetanil și difenoconazol. Pentru siguranță, în fiecare caz se va face în prealabil un test de compatibilitate fizico-chimică și efectuați un test pe cultura respectivă.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr, păr, gutui	Cancerul bacterian	1,67	21 (3)	1 (-)
	Rapăn Bacterioze	3,33	21 (1)	
Prun	Bacterioze	1,67	21 (3)	
	Clasterosporioză	3,33	21 (1)	
Piersic	Bacterioze	1,67	21 (3)	
	Bășicarea frunzelor	3,33	- (1)	
Cais	Bacterioze	1,67	21 (2-3)	
	Clasterosporioză	3,33	21 (1)	
Cireș, vișin	Bacterioze	1,67	21 (3)	
Vița de vie	Mană	2,0	21 (2)	
	Necroza bacteriană	5,33	- (1)	
Nuc	Arsura bacteriană	3,33	21 (1)	
Alun	Pătarea bacteriană			
Migdal	Ciuruirea bacteriană	1,67	21 (2-3)	
Căpșun (câmp deschis și spații protejate)	Pătarea brună Pătarea cafenie Pătarea albă Antracnoze	3,33	21 (1-2)	
	Fasole			
Morcov	Alternarioză Cercosporioză Bacterioze	3,33	21 (1-2)	
	Varză			
Ceapă, ceapă eșalotă	Bacterioze	3,33	21 (1-2)	
	Praz			
Țelină	Bacterioze			
Tomate	Mană Bacterioze			

Norma de consum a soluției de lucru: livezi: 1000-1500 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha;
legume, căpșun: 400-600 l/ha.

ATENȚIE! Amestecul în soluții cu pH mai mic de 6.0-6.5 duce la emanarea rapidă a ionilor de cupru și poate provoca stres sau fitotoxicitate. Nivelul ridicat al pH-ului și vremea rece pot duce la scăderea eficacității.

Nu aplicați acest produs sau orice alt produs pe bază de cupru într-o doză totală mai mare de 28 kg de cupru la hectar pe o perioadă de 7 ani, adică în medie 4 kg/ha pe an (conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2018/1981).



TEHNICA DE APLICARE:

- Nu depășiți dozele recomandate.
- Doza anuală maximă a produsului Nordox 750 WG nu trebuie să depășească 5 kg/ha.
- Folosiți un volum necesar de soluție, astfel încât să se asigure o bună acoperire uniformă a întregului foliaj. Evitați punctul de scurgere a soluției de lucru.
- Nu se recomandă de aplicat tratamente la temperaturi mai mari de +25° C sau la prezența picăturilor de rouă.
- Se recomandă aplicarea preparatului în alternanță cu fungici-

de din alte grupe chimice și cu alt mecanism de acțiune.

- La pomi fructiferi se aplică primăvara devreme la ieșirea din repausul vegetativ pentru combaterea formelor hibernante ale agenților patogeni. De asemenea, se recomandă toamna la căderea frunzelor, pentru diminuarea rezervei de forme rezistente și menținerea stării fitosanitare. Aplicarea lui toamna contribuie la maturarea lemnului și la o mai bună rezistență la îngheț.
- Pentru plante ornamentale se aplică primăvara până la înflorire.



FUNGICIDE



FORMA PREPARATIVĂ:
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 20-12-17-02-0849 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Norus 75 WG este un fungicid sistemic, cu acțiune preventivă și curativă împotriva unui spectru larg de fitopatogeni. Substanța activă ciprodinil penetrează rapid în miceliul ciupercilor susceptibile și împiedică instalarea infecțiilor pe organele tratate prin blocarea respirației și diviziunii celulare a acestora. Se absoarbe bine și rapid prin frunze, manifestă translocare acropetală și translaminară.

PROPRIETĂȚI:

- Mecanism de acțiune unic.
- Acțiune sistemică, preventivă și curativă.
- Risc scăzut de apariție a rezistenței.
- Este recomandat chiar și pentru utilizarea lui în perioada înfloririi.
- Protejează și noile creșteri.
- Favorizează dezvoltarea aparatului foliar sănătos și intensifică procesul de fotosinteză.

AVANTAJE:

- Eficacitate excepțională și la infestări foarte puternice.
- Este un produs strategic care poate fi administrat și la temperaturi mai mici (de la +5° C).
- Rezistent la spălări de precipitații.
- Forma preparativă și normă de consum comodă pentru o mai bună siguranță ecologică.
- Compatibil cu alte produse de uz fitosanitar.
- Este indispensabil în toate sistemele moderne de protecție a plantațiilor pomicole.
- Utilizarea în amestec cu partenerii cu acțiune de contact precum: Kapton 80 WG în raport de 1:1 este benefică într-o strategie durabilă de protecție pe termen lung.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn Monilioze	0,3 - 0,4	28 (2-3)	7 (3)
Prun	Pătarea roșie a frunzelor			
Cireș	Monilioza Clasterosporioza Cocomicoză	0,35-0,4	28 (2)	
Piersic	Bășicarea frunzelor Clasterosporioza Monilioze	0,35	14 (2)	
Cais	Clasterosporioza Monilioze			

Norma de consum a soluției de lucru: 1000-1500 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau înainte de 2-4 ore de ploaie.
- Aplicați un volum necesar de soluție, astfel încât să asigurați o acoperire uniformă a întregului foliaj.
- Evitați punctul de scurgere al soluției.
- Tratamentele împotriva moniliozei se recomandă a se aplica preventiv de la stadiul de buton alb, deschiderea primelor flori până la sfârșitul scuturării petalelor.
- Asigurați funcționarea agitatorului pe toată durata tratamentului.



FORMA PREPARATIVĂ:
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – IV/III

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 20-12-17-02-0855 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Rotengo 20 SC este un fungicid cu acțiune protectivă, curativă și eradicativă. Piraclostrobin este o substanță activă din familia strobilurinelor cu acțiune translaminară și sistemie locală, ce inhibă germinația sporilor și controlează creșterea micelului și sporularea. Substanța activă beneficiază de o lipofilie înaltă, presiune scăzută a vaporilor și solubilitate în apă. Aceasta din urmă îi asigură, de altfel, rezistență la spălare. Piraclostrobinul este preluat rapid de apă și distribuit laminar. O parte din substanța activă se leagă și de stratul ceros al frunzei, unde formează un depozit, iar molecula rămâne activă pe o perioadă de câteva săptămâni.

AVANTAJE:

- Eficacitate ridicată împotriva rapănului și făinării.
- Asigură o protecție de încredere și uniformă a masei vegetative

datorită mișcării translaminare și a sistemiei locale a substanței active.

- Produsul are o puternică acțiune preventivă, inhibând mobilitatea și germinarea zoosporilor.
- Prezența particulelor (depozitului) de produs la suprafața frunzelor permite redistribuirea cu ocazia perioadelor de reumectare a vegetației.
- Datorită proprietăților sale fungicide, combinate cu o bună rezistență la spălare, asigură o protecție foarte bună și de durată pe frunze și fructe.
- La dozele omologate, în condiții normale, produsul este bine tolerat de plante și nu manifestă fenomen de fitotoxicitate.
- Inofensiv pentru albi și entomofagi.

COMPATIBILITATEA:

Este în general compatibil cu insecticide și fungicide, ca și cu îngrășăminte foliare, făcând



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn Făinare	0,5 - 0,6	28 (2)	7 (3)
Vița de vie	Făinare	0,4 - 0,5	35 (2-3)	

Norma de consum a soluției de lucru: 800-1000 l/ha.

excepție cele cu reacție alcalină, acidă și oxidanți puternici. Pentru siguranță, în fiecare caz se va face în prealabil un test de compatibilitate fizico-chimică și efectuați un test pe cultura respectivă.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau înainte de 2-4 ore de ploaie.
- Aplicați un volum necesar de soluție, astfel încât să asigurați o acoperire uniformă a întregului foliaj.

- Evitați punctul de scurgere al soluției.
- Asigurați funcționarea agitatorului pe toată durata tratamentului.
- Pentru obținerea unor efecte maxime de combatere la pomii fructiferi, se aplică tratamentul preventiv începând cu fenofaza de buton roz până la începutul coacerii fructelor. Intervalul dintre tratamente este de 10-14 zile. În cazul perioadelor cu presiune de infecție mare, intervalul între tratamente să nu depășească 9 zile.

Scalos® 400 SC



FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: pirimetanil 400 g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 23-12-21-02-1496 din 21.12.2023

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Constă în inhibarea capacității ciupercii de a produce enzimele necesare procesului de infecție.

PROPRIETĂȚI:

- Fungicid sistemic și translaminar cu efect curativ și eradicativ.
- Spectru larg de combatere a patogenilor din culturile de măr și prun.
- Este cel mai potrivit pentru a fi utilizat într-un program de tratamente preventive.
- Curativ acționează în primele 48 ore de la infecție.

AVANTAJE:

- Eficacitate înaltă la temperaturi scăzute între +8° și +12° C.
- Eficiență înaltă contra agenților patogeni în perioada de păstrare.
- Rezistență la spălare (2 ore după tratament).
- Administrat cu 6 ore înainte de precipitații manifestă efectul fungistatic până la 60 mm de precipitații.

COMPATIBILITATEA:

Scalos 400 SC este compatibil cu majoritatea insecticidelor și fungicidelor folosite, cu excepția celor pe bază de cupru, ce conțin aluminiu și celor cu reacție puternic alcalină. Dar pentru o folosire corectă, este necesar să se verifice compatibilitatea componentelor.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Folosiți un volum de soluție suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului de stropit, se va evita șiroirea.
- Nu pulverizați în condiții de vânt și temperaturile ridicate a aerului. Se va administra preventiv înaintea începutului infectării primare a plantelor.
- Numărul tratamentelor trebuie să fie adaptat sensibilității soiului și gradului de risc de apariție a bolii.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn	0,8	21 (2)	7 (3)
	Monilioza	1,2		
Prun	Clasterosporioza Pătarea roșie a frunzelor Monilioze	1,0	28 (2-3)	
Vița de vie	Putregai cenușiu	2,0 - 2,5	30 (2-3)	
Cais	Clasterosporioza Monilioze	1,5 - 2,0	21 (2-3)	
Piersic	Bășicarea frunzelor Clasterosporioza	1,5 - 2,0	21 (2-3)	
	Monilioze	2,0		

Norma de consum a soluției de lucru: livezi: 1000-1500 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha.



FUNGICIDE





FUNGICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: difenoconazol 250 g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
concentrat emulsionabil (EC)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate - IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 24-02-15-02-1536 din 15.02.2024

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Scorus 25 EC este difuzat rapid de către părțile aeriene ale plantei prin acțiunea sistemică, care contribuie la perturbarea biosintezei sterinelor, care mențin duritatea membranei celulare. Substanța activă inhibă formarea sporilor și creșterea miceliului patogenului în țesuturile plantei.

PROPRIETĂȚI:

- Manifestă proprietăți translaminare asigurând o protecție uniformă a frunzelor.
- Este foarte bine tolerat de culturile agricole indiferent de faza de dezvoltare.
- Are efect preventiv, curativ și repulsiv.
- Ploile survenite după 2 ore de la administrare nu diminuează eficacitatea preparatului.

AVANTAJE:

- Este un produs strategic în toată sistemul de protecție a plantelor pomicole.
- Este foarte bine tolerat de culturile agricole indiferent

de faza de dezvoltare, poate fi utilizat și în faza de înflorire totală.

- Acțiunea preparatului nu depinde de condițiile climaterice, însă există diapazonul optimal al temperaturilor, având eficacitate maximă în intervalul de +14° C până la +25° C, însă la temperaturile sub +12° C acțiunea brusc scade.
- Utilizarea în amestec cu partenerii cu acțiune de contact precum Kapton 80 WG în raport de 1:1 este benefică într-o strategie durabilă de protecție pe termen lung.
- Normă de consum mică.
- Micșorează semnificativ viabilitatea sporilor generațiilor viitoare.

COMPATIBILITATEA:

Compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți. Nu se recomandă amestecuri pe bază de cupru. Înainte de utilizare se va efectua un test de compatibilitate.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn	0,25 - 0,3	20 (2-3)	7 (3)
Prun	Monilioze Clasterosporioza Pătarea roșie a frunzelor	0,25 - 0,3	14 (2-3)	
Cais	Clasterosporioza	0,15	14 (2-3)	
Piersic	Bășicarea frunzelor Clasterosporioza	0,25		
Cireș	Clasterosporioza, cocomicoză			

Norma de consum a soluției de lucru: 1000-1500 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt și temperaturile joase ale aerului (< 12° C).
- Oferiți o bună acoperire a plantelor.

Tratamente preventive: se recomandă aplicarea produsului în principal preventiv, pentru a evita infestarea ireversibilă și eradicarea bolii din cultură. Intervalul dintre tratamente, se adaptează

în funcție de condițiile climaterice evoluția bolii, a culturii și este de 7-10 zile și dacă este necesar se poate reduce și la câteva zile (4-5 zile) în perioada cu ploi abundente și nebulozitate (ceață, negură).

Tratamente curative: împotriva infecțiilor cu rapăn se poate trata curativ în cel mai scurt timp posibil (maximum 24-48 ore) de la infectare. După prima aplicare curativă, se repetă tratamentul cu efect preventiv după 5-7 zile în funcție de condițiile climaterice.



FORMA PREPARATIVĂ:
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 20-12-17-02-0853 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Stroly 50 WG este un fungicid sistemic pe bază de kresoxim-metil, din familia strobilurinelor. Substanța activă, kresoxim-metil, este absorbită de suprafața foliară și translocată prin xilem în tot corpul plantei. Kresoxim-metil-ul inhibă respirația mitocondrială a fungilor, germinația sporilor, creșterea miceliului și producerea sporilor.

AVANTAJE:

- Acțiune sistemică, preventivă și curativă contra patogenilor.
- Distribuție uniformă pe toată suprafața.
- Intensifică fotosinteza (green effect).
- Substanța activă rămâne după aplicare la suprafața frunzelor ca un depozit solid, particulele fiind absorbite în stratul subcicular.



NOTĂ: **Stroly 50 WG** se aplică preventiv. În cadrul tratamentelor în bloc se aplică maxim 2 stropiri consecutive. Aplicarea strobilurinelor trebuie să alterneze cu stropiri cu produse din alte grupe. Pentru o eficacitate mai bună se recomandă de a aplica un tratament combinat **Stroly 50 WG** (cu efect uni-site) + **Kapton 80 WG** (cu efect multi-site).

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Rapăn	0,25 - 0,3	35 (3)	7 (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 800-1000 l/ha.

- Eliberarea substanței active se face treptat, fapt ce conferă o lungă perioadă de acțiune.
- Poate fi aplicat fără riscuri de fitotoxicitate, având o selectivitate excelentă.
- Inofensiv pentru albiși și entomofauna utilă.
- Compatibil cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor și cu fertilizanți.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau înainte de 2-4 ore de ploaie.
- Se va asigura o pulverizare fină și uniformă a foliajului până la punctul de scurgere a soluției.
- Se aplică la măr începând cu fenofaza de buton roz, până la începutul fructificării (fructe de mărimea nucilor).
- Asigurați funcționarea agitatorului pe toată durata tratamentului.

FORMA PREPARATIVĂ:
concentrat emulsionabil (EC)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – III/III

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 22-05-19-02-1095 din 19.05.2022

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Topik 10 EC este un fungicid cu acțiune sistemică pe bază de penconazol, care acționează împotriva ciupercilor în momentul penetrării acestora în plantă și în perioada de formare a haustoriilor. Produsul oprește dezvoltarea bolilor prin interferarea în procesul de biosinteză al steroliilor (ergosterolului) din membranele celulare.

PROPRIETĂȚI:

- Activitate sistemică acropetală și mezosistemică.
- Acționează și prin faza de gaz (vapori).
- Acționează preventiv și curativ.
- Acțiune de lungă durată.
- Eficacitate înaltă împotriva făinărilor, mai cu seamă a infecțiilor primare.
- Este foarte bine tolerat de către plante.

AVANTAJE:

- În scurt timp după administrare este absorbit de către organele verzi ale plantei.

- Deja după 1-2 ore de la administrare, produsul este rezistent față de spălări de precipitații.
- Pentru o mai bună eficacitate acesta se poate amesteca cu alte produse (pe bază de sulf).
- Se utilizează într-un diapazon mare de temperaturi.
- Compatibil cu numeroase produse de uz fitosanitar folosite astăzi pe piață.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Făinare	0,4 - 0,45	20 (2-3)	7 (3)
Vița de vie	Făinare	0,35 - 0,45		
Piersic	Făinare	0,6	14 (2-3)	
Cireș	Cocomicoză	0,5	7 (3)	

Norma de consum a soluției de lucru: livezi: 1000-1500 l/ha;
vița de vie: 600-800 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt sau înainte de ploaie.
- Folosiți un volum necesar de soluție, astfel încât să se asigure o bună acoperire uniformă a întregului foliaj și inclusiv a părților mai puțin expuse ale butucilor de vie (mai ales partea inferioară și ciorchinii).
- Pentru a avea cele mai bune rezultate tratamentele se vor aplica preventiv:

La măr: Acest fungicid se aplică de la începutul înfrunzirii până la scuturarea petalelor, la interval de 7 zile între tratamente pentru stoparea infecțiilor primare și controlul infecțiilor secundare de făinare. După această perioadă, intervalul dintre tratamente poate fi de 7-14 zile. Intervalul dintre tratamente se adaptează în funcție de condițiile



climaterice, evoluția bolii și a culturii.

La vița de vie: primul tratament se recomandă a se aplica preventiv, înainte de dezvoltarea bolii. Dacă au apărut primele simptome de făinare se aplică 2-3 tratamente consecutive la intervalul de 5-7 zile, după care se reiau aplicările preventive 10-14 zile. În cazurile în care în continuare persistă riscul dezvoltării în masă a făinării, se recomandă tratamente mai dure cu utilizarea concomitentă a (în sistemul tank mix) produselor pe bază de sulf.

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Topstar SC este un fungicid combinat din două substanțe active, azoxistrobin și difenoconazol. Ambele componente active ale Topstar SC acționează în cele mai importante momente din ciclul biologic al patogenilor, germinarea și pătrunderea în plantă a sporilor.

Azoxistrobin este o substanță activă din familia strobilurinelor, acționează ca inhibitor al respirației mitocondriale, blocând ciclul energetic al patogenului. Intervine în ciclul biologic al ciupercii, în principal în timpul germinației sporilor și în timpul inițierii penetrării în țesuturile plantei. Prezintă preluare graduală și activitate sistemică locală (translaminară) în frunze. Activitate preventivă. Substanța activă beneficiază de o lipofilie înaltă, presiune scăzută a vaporilor și solubilitate în apă. Aceasta din urmă îi asigură, de altfel, rezistență la precipitații.

Difenoconazol face parte din clasa triazolilor și prezintă acțiune preventivă și curativă, acționând prin

blocarea biosintezei steroizilor în membranele celulare ale fungilor. Acesta are acțiune sistemică locală și ușoară translocare acropetală.

AVANTAJE:

- Acționează în trei moduri: sistemic, translaminar și prin contact.
- Efect protectiv, curativ și anti-sporulant asupra bolilor specifice din cultura de rapiță în toate fazele de dezvoltare.
- Eficiență ridicată datorită a două mecanisme diferite de acțiune complementare una cu alta.
- Protejează noile creșteri prin formarea unui depozit de produs în plantă, fiind reactivat în contact cu apa.
- Efecte fiziologice îmbunătățite cu acțiune asupra fenomenului stay green.
- Unealtă pentru managementul rezistenței datorită sinergiei celor două substanțe active.
- Produsul nu prezintă fitotoxicitate pentru cultură.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Rapiță de toamnă	Alternarioza Fomoza Putregaiul alb	1,0	70 (2)	- (3)
Sfecla de zahăr ■	Cercosporioza		În proces de extindere	
Tomate ■	Mana, alternarioza			

Norma de consum a soluției de lucru: 200-400 l/ha.

RESTRICȚII: A nu se utiliza în livezile de măr, evitați derivarea către culturile învecinate.

COMPATIBILITATEA:

Este compatibil cu foarte multe produse de protecția plantelor și îngrășăminte uzuale. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea Topstar SC cu orice alt produs de protecție a plantelor sau îngrășământ, se va face în prealabil un test de compatibilitate fizico-chimică și se va efectua un test pe cultura respectivă.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Tratamentele se efectuează în zile fără vânt, în orele de dimineață și seara, la temperaturi de până la 25° C.
- **Pentru cultura de rapiță de toamnă,** Topstar SC se aplică preventiv de la stadiul de 4 frunze nedesfăcute și până la



sfârșitul înfloritului în funcție de condițiile de apariție a bolilor.

- **Pentru controlul Fomozei** (*Phoma lingam*), se recomandă două aplicări: prima aplicare în toamnă de la stadiul de mai mult de 4 frunze nedesfăcute, iar a doua aplicare în primăvară, de la stadiul de rozetă și până la apariția butonilor floralii.
- **Pentru putregaiul alb** (*Sclerotinia sclerotiorum*), se recomandă o aplicare pe an în primăvară de la buton galben, până la sfârșitul înfloritului. Momentul optim de aplicare este de la cca.10% până la 50% din florile de pe racemul principal deschise.

■ Produs în proces de extindere



Floramix® SE

ERBICID



SUBSTANȚA ACTIVĂ: 2,4-D (2-ester etil hexilic) 453 g/l
+ florasulam 6 g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
suspo-emulsie (SE)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – III/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-04-15-03-1875 din 15.04.2025

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Floramix SE este un erbicid bicomponent pentru combaterea unui spectru larg de buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv rezistente la 2,4-D, și a unor buruieni perene în semănăturile de grâu și porumb.

2,4-D etilhexil eter și florasulam sunt substanțe active sistemice. Ingredientul activ **2,4-D** aparține erbicidelor de tip auxină, care, atunci când pătrund în plante, se acumulează și perturbă procesul de metabolism al azotului și sinteza enzimatică. **Florasulam** aparține grupului de inhibitori ai acetolactatului sintază. După procesare, pătrunde rapid în plantă prin frunze și rădăcini, se deplasează de-a lungul fasciculelor conductoare (floem, xilem) până la punctul de creștere. Acțiunea preparatului este de a inhiba enzima acetolactat sintază, care, la rândul său, blochează formarea de valină, izoleucină și leucină.

AVANTAJE:

- Controlul buruienilor rezistente la 2,4-D, MCPA.
- Controlul buruienilor greu de eradicat.
- Combate toate tipurile de samulas-tră de rapiță și floarea soarelui.

- Interval larg de aplicare.
- Reducerea riscului de rezistență la buruieni.
- Nu există restricții pentru culturi în rotație.
- Eficientă (raportul calitate/preț).

Spectru de combatere:

Buruieni sensibile: ambrozie (până la 4 frunze), albăstrița comună, busuioc sălbatic, muștar (specie), voinică, fumărița medicinală, rocoiană, lobodă, (specii), mac (specii), pălămidă (specii), traista ciobanului, turița agățătoare (până la 14 noduri), floarea-soarelui (samulastra), rapiță (samulastra), ridichioara sălbatică, mușetel (specie), crușețea de câmp, punguliță de câmp, știr (specie) și alte specii.

Moderat sensibile: plisculcocrului, veronica (specie), măzăricea (specii), hrișcă urcătoare, cânepa sălbatică, linărița de câmp, lingurică, pelin obișnuit, iarbă-grasă, trei-frați pătați, dentiță, jaleș (specii), și alte specii.

Slab sensibile: volbura de câmp, șopârliță, piciorul cocoșului (specii), zărână (specii) și alte specii.

Floramix SE nu are efect asupra buruienilor monocotiledonate și coada-calului.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Grâu	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	0,4 - 0,6	- (1)	- (3)
Porumb				7 (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 200-400 l/ha.

Viteza și simptomele efectului:

În decurs de trei ore de la aplicare, creșterea buruienilor sensibile este oprită. Semnele vizibile de acțiune (decolorarea și înclăcirea frunzelor, reducerea internodurilor) apar după 3-5 zile. Distrugerea finală a buruienilor are loc la 2-3 săptămâni după tratament.

COMPATIBILITATEA:

Floramix SE este compatibil cu o gamă largă de erbicide, insecticide și fungicide. Nu se recomandă de amestecat cu alte produse pe bază de: fenoxaprop-P-etil, diclofop-metil, clodinafop-propagil. Înainte de efectuarea amestecurilor cu alte produse de uz fitosanitar, se vor consulta tabelele de compatibilitate și se va efectua un test practic, respectând dozele prescrise. Erbicidul se poate aplica în amestec cu îngrășăminte foliare.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Pentru o eficiență maximă, erbicidul trebuie aplicat în perioada de creștere activă a buruienilor în faza de 2-6 frunze la plantele anuale și 10-15 cm (rozetă) la plantele perene.
- Temperatura ambiantă optimă pentru utilizarea preparatului este în intervalul de la +12 la +25°C. Evitați



utilizarea preparatului imediat după îngheț sau când se așteaptă îngheț în noaptea după utilizare.

- Nu pulverizați în condiții de vânt. Evitați deriva soluției de stropit pe culturile aflate în vecinătate.
- Produsul se aplica la cereale păioase când buruienile au 2-4 frunze, iar cultura de la începutul înfrățirii până la formarea de-al 2-lea internod al culturii
- La porumb, produsul se aplică când buruienile dicotiledonate anuale au 2-4 frunze, cele perene au maxim 10 cm înălțime, iar cultura se află în stadiul de 3-5 frunze.
- Produsul nu se aplică la porumbul care a fost tratat cu insecticide organofosforice.



ERBICIDE





ERBICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: glifosat 480 g/l, sare

FORMA PREPARATIVĂ:
concentrat solubil (SL)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 23-12-21-03-1499 din 21.12.2023

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Glifor 480 SL este un erbicid total, neselectiv cu acțiune sistemică asupra unui spectru larg de buruieni. Produsul acționează prin blocarea biosintezei acizilor aminici aromatici practic la toate buruienile anuale și perene.

AVANTAJE:

- Erbicid neselectiv eficient în combaterea tuturor buruienilor și tufarilor.
- Datorită adjuvantului și surfactantului, substanța activă este absorbită mai bine de către plante și face ca produsul să fie mult mai rezistent față de spălarea de către precipitații.
- Erbicidul acționează atât la aparatul foliar cât și la sistemul radicular și nu permite ca planta să regenereze.
- Eficacitate înaltă în curățirea câmpurilor de buruieni problematice.
- Fără restricții în rotația culturilor.

- Cele mai bune rezultate se obțin în condiții de temperatură și umiditate relativ ridicate.

MOD DE ACȚIUNE:

Erbicidul este eficient numai pentru buruienile ce se află în vegetație activă. Produsul este absorbit rapid prin toate organele verzi ale plantei, se translocă prin plantă acumulându-se în țesuturile meristematice (vârfurile de creștere) ale rădăcinii pe care le distruge. Translocarea în plante este în mare măsură influențată de condițiile de vegetație pe care le au plantele de buruieni (în plantele stresate translocarea este lentă și adeseori incompletă, în timp ce în plantele cu creștere activă translocarea este accelerată). La circa trei ore de la aplicare, el pătrunde în plante și acționează asupra organelor generative, distrugând complet buruienile. Simptomele acțiunii preparatului se văd după 7-10 zile, când buruienile se îngălbenesc și se usucă.

ATENȚIE!

- Nu se aplică pe părțile verzi ale culturii.
- Nu se aplică pe buruienile în stare de stres, buruieni îmbătrânite, pe temperaturi mai mari de 30°C, arșiță, la prezența picăturilor de rouă pe plantă.
- La pregătirea soluției de lucru produsul se toarnă lent în rezervorul mașinii de stropit pentru a nu provoca spumarea excesivă.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Măr	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	2,0	- (1)	7 (3)
	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	4,0		
Câmpuri după recoltarea culturilor agricole	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	4,0		- (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 150-300 l/ha.

TEHNICA DE APLICARE:

- Nu depășiți dozele recomandate.
- Nu pulverizați în condiții de vânt pentru a evita deriva pe culturile adiacente.
- Pentru erbicidare totală se aplică în faza de creștere intensivă a buruienilor. În plantațiile de măr produsul se va aplica în benzi pe rândul de plante, dirijat sub coroanele pomilor, pe vreme fără vânt cu condiția protejării culturii.
- Nu afectează pomii fructiferi dacă produsul ajunge pe coaja matură. Benzile tratate nu se vor cosi sau toca în decurs de 10 zile de la tratament.



ERBICIDE





ERBICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: tribenuron-metil 750 g/kg

FORMA PREPARATIVĂ:
granule dispersabile în apă (WG)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-04-15-03-1906 din 15.04.2025

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Grin Star 75 WG este absorbit prin frunze și rădăcini și este translocat rapid în întreaga plantă. El inhibă diviziunea celulară la buruienile sensibile, ca rezultat creșterea buruienilor se blochează și ele nu mai concurează cu cultura, ca rezultat survine moartea acestora.

AVANTAJE:

- Eficient la o gamă largă de buruieni cu frunza lată.
- Fără restricții asupra culturii ce urmează în rotație.
- Posibilitatea preparării unor tank-miksuri.
- Formulare modernă: risc- pericol redus pentru mediu.
- Ploaia survenită la două ore după aplicare, nu reduce eficacitatea produsului.
- Flexibil în aplicare, de la răsărire până la 8 frunze ale florei soarelui și frunza standard la grâu.
- Raport preț/calitate excelent-economic.
- Nu este fitoxic pentru culturile omologate la concentrațiile recomandate.

RAPIDITATE DE ACȚIUNE:

Primele simptome de suprimare a buruienilor apare la 5-8 zile după tratare, distrugerea completă apare după 10-25 zile, în funcție de tipurile de buruieni și condițiile climaterice. Timpul cald și umed intensifică acțiunea erbicidului, dar timpul răcoros și uscat încetinește acțiunea lui.

COMPATIBILITATEA:

Grin Star 75 WG poate fi utilizat în amestec cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor și îngrășămintelor foliare, cu excepția celor cu reacție puternic alcalină sau acidă. **Nu se recomandă utilizarea concomitentă cu erbicide graminicide.**

PREVENIREA DERIVEI:

Evitați deriva soluției de stropit pe culturile alăturate sensibile precum: sfecla de zahăr, rapița, legume, pe suprafețele ce urmează a fi cultivate sau sursele de apă.

RESTRICȚII:

- Nu aplicați produsul pe culturi care suferă de stres: secetă, temperaturi extreme, bălțire, infestate de insecte,

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (kg/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Floarea soarelui (hibridi rezistenți la erbicidul Grin Star 75 WG)	Buruieni dicotiledonate anuale și unele perene	30-50 g/ha + SAS Trant - 200 ml/ha	- (1)	7 (3)
Grâu	Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și unele perene	20-25 g/ha + SAS Trant - 200 ml/ha		- (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 200-300 l/ha.

te, deficiențe nutritive sau alți factori ce reduc creșterea.

- Nu aplicați pe culturi umezite de ploaie sau rouă.
- Nu aplicați pe solurile foarte nisipoase cu conținut foarte scăzut în materie organică.
- Nu aplicați produsul la temperaturi sub +10° C sau peste +25° C.
- Nu aplicați produsul peste floarea soarelui în faza cotiledoane sau care a depășit faza de 8 frunze.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Eficacitate maximă se obține în faza de 2-4 frunze a buruienilor cu frunza lată anuale și în faza de rozetă la cele perene. Tratamentele se efectuează primăvara în postemergență până în stadiul de 8 frunze a florei soarelui și la cereale păioase de la înfrățire până la apariția frunzei standard.

Asocierea erbicidului cu surfactantul Trant permite combaterea superioară a buruienilor mediu sensibile, precum și o mai bună translocare a produsului în plantă.

- În caz de compromitere a culturilor de grâu sau floarea soarelui tratate cu **Grin Star 75 WG**, indiferent de cauză, se pot resemăna numai floarea soarelui (exclusiv hibridi rezistenți la erbicidul **Grin Star 75 WG**) sau cereale de primăvară (grâu, ovăz, orz) după arătură adâncă.



ERBICIDE





ERBICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: mesotrion 75 g/l
+ nicosulfuron 30 g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
ulei dispersabil (OD)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – III/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 20-12-17-03-0858 din 17.12.2020

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Ilumins 105 OD - erbicid selectiv, sistemic, postemergent pentru combaterea buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene din cultura porumbului. **Nicosulfuron** – acționează sistemic prin stoparea diviziunii celulare și blochează sinteza aminoacizilor. **Mesotrion** – este absorbit prin rădăcină, tulpină și frunze și este translocat în toată planta. Inhibă sinteza carotenoidei, în consecință clorofila se distruge ceea ce duce la albirea buruienilor.

PROPRIETĂȚI:

- Este un erbicid postemergent pentru cultura porumbului.
- Eficient în combaterea buruienilor mono și dicotiledonate anuale și perene.
- Posedă doi compuși activi din grupe chimice diferite.
- Are acțiune multiplă, în principal foliară, dar și la sol, radiculară și antigerminativă.
- Este recomandat să fie administrat în faze timpurii a buruienilor.
- În dependență de varietatea buruienilor și intensitatea lor se va corecta și doza preparatului.

AVANTAJE:

- Combinația ideală între două substanțe active pentru un spectru mai larg de buruieni combătute.
- Acțiune multiplă - ceea ce îl face eficient în combaterea buruienilor problemă (control total împotriva costreii din rizomi).
- Formulare unică - OD (ulei dispersabil).
- Flexibilitate în alegerea momentului aplicării, începând cu 3 frunze până la stadiul de 6-8 frunze a porumbului.
- Selectivitate bună față de cultură.
- Soluția dintr-o singură trecere.

Restricții de utilizare: Nu aplicați **Ilumins 105 OD** la loturi de hibrid de porumb. Nu aplicați acest erbicid în cazul în care semințele și/sau cultura de porumb au fost tratate cu insecticide organofosforice. Nu amestecați **Ilumins 105 OD** cu fertilizanți foliar sau îngrășăminte minerale. Nu aplicați în amestec cu alte erbicide sulfonilureice sau în sole tratate cu acest tip de produse. În anumite condiții, după tratamente cu **Ilumins 105 OD** pot apărea simptome tranzitorii de îngălbenire și/sau limitarea creșterii culturii la un interval de 1-2 săptămâni de la aplicare. Acestea sunt

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Porumb	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	1,5 - 2,2	- (1)	7 (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 200-400 l/ha.

rapid depășite, nefiind observate efecte negative asupra producției. Aplicarea nu se recomandă la culturile aflate în stres: atac de dăunători, temperaturi scăzute, exces de umiditate sau secetă. Evitați aplicarea produsului la temperaturi mai mici de 10° C sau mai mari de 25° C.

Recultivarea: Porumbul pentru boabe sau pentru furaj poate fi resemănat imediat în cazul compromiterii culturii tratate cu **Ilumins 105 OD**. Arătura este recomandată înainte de resemănare.

Rotația culturilor: În toamnă se pot semăna grâu și orz de toamnă după porumbul tratat cu **Ilumins 105 OD**. În primăvara următoare pot fi semămate porumb pentru boabe și furaj, orz sau grâu de primăvară.

Atenționări: Folosiți doza mai mare pe soluri mai grele sau cu infestare puternică cu buruieni. Eficacitate optimă a tratamentului se obține în condițiile de pregătire bună a patului germinativ, fără bulgări, bine mărunțit în primăvară, după arătura de toamnă.

Se va urmări aplicarea erbicidului Ilumins 105 OD în stadii timpurii de dezvoltare a buruienilor astfel:

- buruieni dicotiledonate 2-4 frunze, graminee 2 frunze până înainte de înfrățit, costrei din rizomi 10-20 cm.

- doza recomandată în general în cazul îmburuienărilor cu buruieni anuale este de 1,5 l/ha, în cazul îmburuienărilor predominante cu costrei din rizomi se va utiliza doza maximă de 2,2 l/ha.

Spectru de combatere - buruieni mono și dicotiledonate

Teișor (pristolnic), Știr sălbatic, Spanac sălbatic, Ciumăfaie, Pălămidă, Lobodă, Nap, Busuioc sălbatic, Mac de câmp, Ardeul broaștei, Troscot, Hrișcă urcătoare, larba roșie, larba grasă, Zârna neagră, Susai, Hrana vacii, Rocoina, Trei frați pătrați, Cornuți, Păpădie, Traista ciobanului, specii de Urzică, specii de Mohor, Fiuță anuală, Costrei.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate;**
- Nu cultivați după aplicarea erbicidului **Ilumins 105 OD** și nu aplicați pe cultura de porumb proaspăt cultivată.
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- Aplicarea se efectuează pe timp uscat, senin și calm, când precipitațiile în primele 8-10 ore după tratament sunt improbabile.
- Trebuie luate măsuri pentru a evita împrăștierea soluției de tratare pe culturile învecinate și/sau pe terenurile neagricole din afara ariei de tratare.



ERBICIDE



FORMA PREPARATIVĂ:
concentrat solubil (SL)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – IV/III

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 24-03-28-03-1583 din 28.03.2024

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Imox 40 SL - erbicid selectiv, pe bază de imazamox, din grupa imidazolinonelor, cu aplicare postemergentă, pentru combaterea unei game variate de buruieni dicotiledonate și monocotiledonate anuale, în cultura de floarea-soarelui (hibridi rezistenți la erbicide din grupa imidazolinonelor).

Substanță activă este preluată de plante în special prin frunze și doar într-o mică măsură prin rădăcini, se deplasează prin floem și xilem, acumulându-se în zonele merismatice unde blochează sinteza aminoacizilor esențiali, responsabili de creșterea și diviziunea celulară. Simptomele apar numai la câteva zile după tratament, iar distrugerea completă apare în decurs de 3-6 săptămâni de la tratament.

AVANTAJE:

- Imazamox prezintă efect rezidual, ceea ce asigură combaterea și celui de-al doilea val de buruieni fără a fi necesar aplicarea unui nou tratament cu erbicid.
- Erbicidul combate toate rasele de Orobanche (inclusiv hibridii noi).
- Un nou standard pentru protejarea floarei soarelui IML.
- Selectivitate ridicată în raport cu plantele cultivate.
- Afectează enzimele care se găsesc numai în plante și, prin urmare, sunt practic inofensive pentru animale și oameni.

- Compatibil în amestecuri cu insecticide, fungicide, regulatori de creștere și fertilizanți.

Spectru de combatere: buruieni mono- și dicotiledonate:

Buruieni sensibile sunt majoritatea buruienilor dicotiledonate anuale: Teișor, Știr, Ambrozie, Ciumăfae, Zârna, Cornaci, Lupoiaia.

Unele monocotiledonate anuale: Meișor roșu, Iarbă bărbosă, Mohor, Mei sălbatic. Produsul are efect de stopare a creșterii buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate perene, cum ar fi: Pălămida, Volbură, Costrei, Pir.

Avertizare:

Imox 40 SL are efect rezidual. De aceea după aplicare se va ține cont de perioada de restricție până la înființarea culturii următoare, astfel:

- Puteți semăna grâu de toamnă, secară nu mai devreme de 4 luni;
- Lucerna, soia, orz, ovăz, sorg, porumb, mazăre - după 9 luni;
- Cartofi, floarea soarelui, tomate, ceapă, tutun, calata, castraveți, morcov, hrișcă, și alte culturi - după 19 luni;
- Sfecla de zahăr și furajeră, rapiță - după 26 luni.

În cazul întoarcerii unei culturi erbicidată cu **Imox 40 SL**, se va putea semăna imediat hibridi de floarea soarelui sau soia rezistenți la erbicide din grupa imidazolinonelor.

ATENȚIE!

Utilizarea unui produs cu o substanță activă din clasa imidazolinonei pe același câmp este permisă o dată la 3 ani!

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Floarea soarelui (hibridi rezistenți la erbicidul Imox 40 SL)	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	1,0 - 1,2	- (1)	- (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 200-400 l/ha.

COMPATIBILITATEA:

Preparatul nu se amestecă cu graminicidele în rezervor. Compatibil în amestecuri cu insecticide, fungicide, regulatori de creștere și fertilizanți. Pentru a crește eficacitatea împotriva speciilor mai sensibile și a buruienilor în faze înaintate de dezvoltare (mai mult de 6 frunze), se recomandă utilizarea acestuia împreună cu surfactanți (adjuvanți) sau cu uleiuri minerale. Este recomandat să se procedeze la un test preliminar cu amestecul preconizat.

TEHNICA DE APLICARE:

- Nu depășiți dozele recomandate;**
- La floarea soarelui (hibridi rezistenți la erbicidul **Imox 40 SL**), se aplică postemergent, când plantele cultivate au 4-5 frunze, iar buruienile dicotile anuale au 2-4 frunze și monocotilele anuale 1-3 frunze până la înfrățire.
- Pentru combaterea lupoaii (Orobanche cumana), recomandăm aplicarea în fenofaza de 6-8 frunze a floarei soarelui. În cazul în care se dorește combaterea buruienilor și a lupoaii, se aplică în faza de 6 frunze a floarei soarelui, dar nu mai târziu de faza de 4 frunze a buruienilor dicotiledonate.

- Temperatura aerului în momentul aplicării cuprinsă în intervalul de la +15° C până la +22° C.
- Temperaturile sub +10° C și peste +25° C, încetinesc procesele metabolice la buruieni și pot afecta negativ eficacitatea erbicidului.
- În unele cazuri, după aplicarea erbicidului, creșterea plantelor este întârziată sau se observă o schimbare a culorii. Acest lucru se întâmplă de obicei sub influența factorilor de stres de mediu (temperaturi scăzute sau ridicate, secete severe, îmbiate cu apă). De regulă, creșterea și aspectul normal al plantelor sunt restabilite în câteva zile.
- Norma de consum a soluției este recomandată între 200 și 400 l/ha în funcție de gradul de îmburuienare, intensitatea vântului și temperatura aerului, pentru a asigura acoperirea completă al aparatului foliar și prevenirea driftului (scurgerea picăturilor de pe frunze).
- Se va evita ca soluția de stropit să ajungă pe alte suprafețe sau culturi (ex. sfecla, în, legume, pomi fructiferi).
- În termen de 10 zile de la aplicare, este necesar să se excludă lucrările mecanizate, care vor perturba „ecranul” erbicid de pe sol.



ERBICIDE

FORMA PREPARATIVĂ:
concentrat emulsionabil (EC)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – IV/IV

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 23-11-28-03-1461 din 28.11.2023

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Miuris 125 EC este un erbicid cu acțiune sistemică, selectiv. Substanța activă a erbicidului este rapid absorbită de frunze și alte părți aeriene ale buruienilor monocotiledonate. Ulterior se translocă în toate punctele de creștere intensă, inclusiv în rădăcini și rizomi, unde distruge lipidele din celulele meristematice. Erbicidul nu pătrunde în sol și nu are nici un efect asupra buruienilor care apar după tratament.

AVANTAJE:

- Este selectiv pentru culturile cu frunza lată.
- Nici o limitare privind etapele de dezvoltare a culturilor în timp de aplicare a produsului.



- Eficiență înaltă contra samurșei de cereale păioase.
- Protecția durează până la sfârșitul perioadei de vegetație.

RAPIDITATE DE ACȚIUNE:

- Primele simptome de suprimare a buruienilor apare la 7-10 zile. Buruienile tratate își încetează creșterea, frunzele tinere capătă o nuanță gălbuie. Distrugerea completă apare la 1-3 săptămâni după tratare, în funcție de tipurile de buruieni și de condițiile climaterice. Cultivarea ar trebui să fie evitată timp de 2-3 săptămâni după tratament.
- Ploile survenite până la 2 ore de la tratament diminuează eficacitatea erbicidului.



ATENȚIE!

Nu se recomandă amestecuri cu erbicide împotriva buruienilor dicotiledonate la culturile date.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Floarea soarelui	Buruieni monocotiledonate anuale	0,6	- (1)	7 (3)
Rapiță				- (3)
Floarea soarelui	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,2	- (1)	7 (3)
Soia, rapiță		1,0		- (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 200-400 l/ha.



TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Se aplică cu stropitori suspendate sau remorcate, evitând ca erbicidul să ajungă accidental pe culturi monocotiledonate de porumb, cereale păioase, etc.
- Cele mai bune rezultate se obțin prin pulverizarea buruienilor

în faza de creștere intensă. Nu se recomandă utilizarea erbicidului asupra culturii în condiții de stres (ca urmare a înghețului, vânt, daune de insecte, nutriția rea a plantelor, sau erbicide utilizate anterior).

- Nu este fitotoxic pentru culturile dicotiledonate dacă sunt respectate normele de aplicare.



Radial 4 OD



ERBICID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: nicosulfuron 40 g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
ulei dispersabil (OD)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – III/III

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 25-11-21-03-2055 din 21.11.2025

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Radial 4 OD este un erbicid selectiv, sistemic, cu acțiune postemergentă, pe bază de nicosulfuron, utilizat în cultura de porumb pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și perene. Substanța activă, nicosulfuron, este preluată rapid de frunzele buruienilor și este transportată în întreaga plantă prin xilem și floem, ajungând la țesuturile meristemice (zonele de creștere activă). Nicosulfuron-ul acționează prin inhibarea enzimei ALS (acetolactat sinteză), oprind diviziunea celulară și ducând la moartea buruienilor.

AVANTAJE:

- Formulare nouă, foarte eficientă: dispersie în ulei (OD).
- Aderență crescută a soluției pe suprafața frunzei și rezistență la ploaie.
- Acoperire mai bună a frunzei cu soluție.
- Crește capacitatea de produs care pătrunde în plantă.
- Nu necesită folosirea unui adjuvant.

- Perioadă de aplicare extinsă.
- Fără restricții de rotație a culturilor după recoltarea porumbului.
- Compatibilitate excelentă cu majoritatea pesticidelor.

MOD DE UTILIZARE:

Erbicidul **Radial 4 OD** se aplică diferit (ca moment și doză) în funcție de speciile de buruieni graminee predominante:

- buruienile anuale - se erbicidează mai timpuriu (faza de 2-3 frunze ale buruienilor) și doze mai mici (1 l/ha), într-un singur tratament;
- gramineele perene - se erbicidează mai târziu (10-25 cm înălțime la costrei) și în doze mai mari (1,5 l/ha), aplicate fie într-un singur tratament, fie în 2 tratamente secvențiale, astfel:
 - tratamentul 1: doză de 1 l/ha, în faza de înfrățire a buruienilor;
 - tratamentul 2: doză de 0,5 l/ha, la reînflorare, după circa 2-3 săptămâni.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Porumb	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale	1,25 - 1,5	- (1)	7 (3)

Norma de consum a soluției de lucru: 200-400 l/ha.

ACȚIUNEA ERBICIDULUI:

Primele simptome (vizibile) apar la câteva zile de la aplicarea produsului. Buruienile se necrozează și mor în decurs de una până la trei săptămâni. Această perioadă depinde în mare măsură de condițiile meteorologice (temperatură și umiditate a solului). Vremea caldă și umedă accelerează acțiunea produsului, temperatura scăzută și seceta pot întârzia acțiunea acestuia. Acțiunea produsului este mai rapidă atunci când condițiile de vegetație sunt optime și buruienile sunt în faza de creștere activă.

SPECTRU DE COMBATERE:

Buruieni monocotiledonate anuale: *Setaria spp.* (mohor), *Echinochloa crus-galli* (iarba bărboasă), *Digitaria sanguinalis* (meișor);

Buruieni monocotiledonate perene: *Sorghum halepense* (costrei atât din semințe cât și din rizomi) și *Agropyron repens* (pir).

Efect parțial de combatere asupra unor dicotiledonate: *Amaranthus retroflexus* (știr), *Chenopodium album* (lobodă), *Solanum nigrum* (zărna), *Polygonum spp.* (iarba ro-

șie), *Stellaria media* (rocoina), *Sinapis arvensis* (muștar), *Datura stramonium* (ciumăfaie).

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt.
- Aplicarea se efectuează pe timp uscat, senin și calm.
- Trebuie luate măsuri pentru a evita împrăștierea soluției de tratare pe culturile învecinate și/sau pe terenurile neagricole din afara ariei de tratare.
- Momentul optim de aplicare: stadiul de 3-5 frunze al porumbului. Evitați utilizarea înainte de stadiul de 2 frunze sau după stadiul de 6 frunze.
- Pentru a pătrunde complet în plantă este necesar ca după efectuarea tratamentului să nu plouă pentru o perioadă de 4-5 ore.
- Erbicidele Radial 4 OD combat numai buruienile răsărite. Nu se recomandă aplicarea produsului atunci când cultura de porumb este slab dezvoltată sau trece printr-o perioadă de stres.



ERBICIDE



CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 21-12-22-03-1026 din 22.12.2021

FORMA PREPARATIVĂ:
concentrat emulsionabil (EC)

TOXICITATE:
clasa de pericolozitate – III/IV

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Star Super EC este un erbicid sistemic, postemergent, pe bază de fluroxipir. Fluroxipir-ul aparține grupei chimice a acizilor piridin-carboxilici, cunoscută pentru perturbarea creșterii celulelor plantelor în tulpinile și frunzele nou formate. Produsul se absoarbe prin frunze și se translocă rapid, atât ascendent, cât și descendent către alte părți ale plantelor și provoacă o reacție de tip auxinic (inclusiv răsucirea frunzei) la buruienile sensibile, la numai câteva ore de la aplicarea tratamentului. Efectul erbicidului poate fi observat la 7-10 zile de la aplicare, când buruienile sunt oprite din dezvoltare, au culoarea verde deschis până la galben, culminând cu distrugerea totală.

PROPRIETĂȚI:

- Flexibil în perioadele de administrare.
- Combate cu succes majoritatea buruienilor anuale și perene, inclusiv pe cele rezistente la 2,4D.
- Eficacitate deosebită împotriva speciilor de turiță și volbură.

AVANTAJE:

- Extrem de selectiv față de cultură.
- Acțiune rapidă.
- Fiind sistemic, pătrunde rapid în țesuturi ceea ce îl face stabil la că-

deri de precipitații chiar și la o oră de la administrare.

- Este unul dintre puținele erbicide care poate fi administrat chiar și până în faza de burduf a cerealelor.
- Volbura și turița sunt sensibile la acțiunea erbicidului în orice fază de dezvoltare.
- Distruge buruienile perene din rădăcini astfel curăță câmpurile de buruieni problemă.

Buruieni combătute:

Specii sensibile (eficacitate biologică mai mare de 90%) - turița, volbura, hrișcă urcătoare, ardeiul broaștei, măcriș, steje, rocină, nu-mă-uita, zărnă neagră, pădădie etc.

Buruieni cu sensibilitate medie – șopârliță, troscot, fumăriță, urzică, scânțieț, samulastra de floarea soarelui, romaniță de câmp, trei frați pătați etc.

Buruieni slab sensibile – susai (specii), loboda albă, mac roșu.

ROTAȚIA CULTURILOR:

În caz de cultură calamitată, se pot înființa următoarele culturi după aplicarea erbicidului Star Super EC, după cel puțin 5 săptămâni: culturile de cereale de primăvară, rapiță de primăvară, porumb, ceapă.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/ha)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Grâu	Buruieni dicotiledonate anuale	0,5	- (1)	- (3)
	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	0,7		

Norma de consum a soluției de lucru: 200-400 l/ha.

CULTURI POSTMERGĂTOARE

(rotație normală a culturilor):

În rotație normală, toate culturile se pot înființa după aplicarea erbicidului la dozele recomandate, cu următoarele mențiuni de respectat:

- Nu mai devreme de 5 săptămâni de la aplicarea erbicidului: cereale de toamnă, rapița de toamnă, ceapă;
- Nu mai devreme de 10 săptămâni de la aplicarea erbicidului: lucernă, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, soia, tomate, morcov;
- Nu mai devreme de 15 săptămâni de la aplicarea erbicidului: trifoi, mazăre, fasole.

COMPATIBILITATEA:

Poate fi compatibil cu alte pesticide în mod curent, cu excepția produselor cu reacție puternic alcalină. Pentru completarea spectrului de combatere, poate fi combinat cu alte erbicide: inclusiv sulfonylureice (tribenuron-metil), florasulam, graminicide. Înainte de utilizare este necesară consultarea tabelor de compatibilitate și efectuarea unui test practic.

TEHNICA DE APLICARE:

- **Nu depășiți dozele recomandate.**
- Nu pulverizați în condiții de vânt. Evitați deriva soluției de stropit pe

culturile alăturate sensibile, precum: sfecla de zahăr, rapița, legume, soia, vița de vie sau sursele de apă.

- Efectul optim al erbicidului poate fi atins la tratarea buruienilor anuale dicotiledonate în faza de 2-8 frunze (înălțimea 5-10 cm), celor perene în faza până la formarea tulpinii (înălțimea 10-15 cm). Soluția aplicată trebuie să acopere complet întreg aparatul foliar al buruienilor, astfel încât efectul erbicidului să fie maxim.
- Nu se vor trata culturi aflate sub stres, ce poate fi cauzat de îngheț, secetă, deficiențe de nutriție, bălțiri de apă, atac de boli sau dăunători. Nu se va aplica dacă temperaturile peste noapte sunt scăzute și dacă un îngheț este prognozat.
- Nu se va face nici o lucrare superficială a solului timp de 7 zile.
- Tratamentele se vor efectua pe vreme uscată. Preparatul este rezistent la spălări de ploii, la o oră după aplicare.
- Temperatura optimă de aplicare este între +8°C - +25°C. În aceste condiții, plantele se dezvoltă normal, ceea ce, la rândul său, contribuie la pătrunderea activă a preparatului prin suprafața frunzelor și la deplasarea acestuia către punctele de creștere a plantelor.



ERBICIDE



FUNGICID
TRATANT

SUBSTANȚA ACTIVĂ: difenoconazol 90 g/l
+ tebuconazol 45 g/l
+ azoxistrobin 40 g/l

FORMA PREPARATIVĂ:
suspensie concentrată (SC)

TOXICITATE:
clasa de periculozitate – III/III

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:
Nr. 24-12-03-04-2-1719 din 03.12.2024

MECANISMUL DE ACȚIUNE:

Triplo Max SC reprezintă un produs care combină trei substanțe active de înaltă eficacitate, cu acțiune sistemică în sămânță și plantulă, astfel împiedicând dezvoltarea miceliului ciupercilor localizate pe semințe, în interiorul acestora și în sol.

Difenoconazol - inhibă biosinteza ergosterolului, dar este mai puțin solubil în apă decât tebuconazolul. Din acest motiv, absorbția difenoconazol-ului de către semințe și plantule are loc treptat, oferind protecție pe termen lung a coleoptilului de infecție. Spre deosebire

de tebuconazol, difenoconazol-ul se acumulează în principal în sistemul radicular și în partea bazală a tulpinii, protejând plantele de agenții patogeni ce provoacă putregaiul rădăcinilor pentru o lungă perioadă de timp.

Tebuconazol - inhibă biosinteza ergosterolului în membranele celulare ale fitopatogenilor, ceea ce duce la moartea acestora. Previne dezvoltarea infecției externe și interne a semințelor.

Azoxistrobin - inhibă respirația mitocondrială, blocând transportul de electroni în citocromii b și c1, având efect antisporulator și inhibitor asupra sporilor patogeni.



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:

Cultura	Organismul nociv	Norma de consum a produsului (l/t)	Intervalul de pauză înainte de recoltare (Numărul maximal de tratamente)	Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)
Grâu de toamnă	Făinare Septorioză Mălura comună Pirenoforoză Putregaiurile rădăcinilor	0,5 - 0,6	- (1)	- (-)

Norma de consum a soluției de lucru:

Pentru a trata 1 tonă de semințe, utilizați cel puțin 10 litri de soluție de lucru.

AVANTAJE:

- Triplo Max SC oferă un spectru larg de combatere, eficacitate excelentă și protecție maximă.
- Conține trei ingrediente active care nu numai că se completează reciproc, dar oferă și un efect cumulativ.
- Controlul extrem de eficient al unei game largi de agenți patogeni din sol și sămânță.
- Protecție de neegalat împotriva putregaiului rădăcinilor.
- Protejează în mod fiabil spicele contra coplexului de boli.
- Nu afectează capacitatea germinativă a semințelor. Eficacitatea produsului se reflectă în sporul de recoltă și în calitatea mărită a producției.



minimum riscul de rezistență la agenții patogeni.

TEHNICA DE APLICARE:

- Pentru tratare se recomandă folosirea semințelor curățate de praf și impurități, asigurând o mai bună aderență și calitate a tratării.
- Înainte de a pregăti soluția de lucru, agitați bine recipientul.
- Soluția de lucru se va pregăti imediat înainte de tratarea semințelor.
- Tratarea semințelor se efectuează preventiv sau nemijlocit înainte de semănat.
- Doar semințele condiționate care corespund cerințelor pot fi tratate în prealabil, în condiții adecvate, pentru depozitarea ulterioară.
- Soluția de lucru preparată trebuie utilizată în aceeași zi.

COMPATIBILITATEA:

Triplo Max SC este compatibil cu majoritatea produselor fungice și insecticide pentru tratarea semințelor. Nu este permisă amestecarea suspensiei cu substanțe care prezintă o reacție puternic acidă sau puternic alcalină.

REZISTENȚĂ:

Produsul conține trei substanțe active din două clase chimice cu mecanisme de acțiune diferite, ceea ce reduce la

MOD DE ACȚIUNE:

- Îmbunătățește proprietățile de umectare a soluției de lucru, ceea ce determină formarea unei pelicule uniforme pe suprafața plantelor.
- Sporește aderarea și ușurează pătrunderea erbicidului în țesuturi.
- Crește eficacitatea și viteza de acțiune a erbicidului în perioadele cu creștere redusă, determinată de secetă sau temperaturi scăzute și pentru buruieni care sunt greu de umectat.

AVANTAJE:

Îmbunătățește acțiunea substanței active pe frunze și permite utilizarea dozelor reduse a erbicidului.

DOZA RECOMANDATĂ:

- **Trant** se utilizează în normă de 0,1% (100 ml/100 litri apă) la consumul soluției de lucru 200-300 l/ha.

- La lucrările cu un volum mai mic, trebuie de utilizat nu mai puțin de 150 ml Trant la hectar.
- În condiții toride se recomandă de mărit norma de consum la Trant până la 300 ml/ha.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

- Se folosește cu erbicidul **Grin Star 75 WG**.
- Rezervorul stropitoareii se umple pe jumătate cu apă și se adaugă cantitatea necesară de erbicid, cu agitarea continuă a soluției. Se oprește agitarea soluției, se adaugă **Trant** și se umple rezervorul cu volumul necesar de apă, continuând din nou agitarea soluției.
- Când se amestecă mai multe produse în rezervorul echipamentului de erbicidat, **Trant** se adaugă ultimul după omogenizarea soluției.

NOTE

PROTECȚIA MĂRULUI DE BOLI

Nobel 25 EW 0,75 - 1,0 l/ha făinare									
Magnat 75 WG 0,25 - 0,3 kg/ha; Topik 10 EC 0,4 - 0,45 l/ha; Bercus WG 0,7 - 0,8 kg/ha făinare									
Rotengo 20 SC 0,5 - 0,6 l/ha; Flint Stars SC 0,5 - 0,7 l/ha rapăn, făinare									
Eflin 80 WP 5,0 kg/ha arsură bacteriană, rapăn									
Scalos 400 SC 1,2 l/ha; Nanto 50 SC 1,0 - 1,25 l/ha Norus 75 WG 0,3 - 0,4 kg/ha; Forsaj 62,5 WG 0,35 - 0,4 kg/ha monilioza, rapăn									
Stroly 50 WG 0,25 - 0,3 kg/ha; Sorus 25 EC 0,25 - 0,3 l/ha Scalos 400 SC 0,8 l/ha; Norus 75 WG 0,3 - 0,4 kg/ha rapăn Eflin 80 WP 5 kg/ha arsură bacteriană, rapăn									
Kaption 80 WG 2,0 - 2,5 kg/ha; Delin 70 WG 0,7 - 1,0 kg/ha; Nanto 50 SC 0,5 - 0,7 l/ha; Folipec 80 WG 1,5 - 2,0 kg/ha rapăn									
Kuprumacs 840 DF 2,5 - 3,0 kg/ha NORDOX 750 WG 1,67 - 3,33 kg/ha rapăn, bacterioze, focul bacterian									
Bercus WG 0,7 - 0,8 kg/h putregaiul cenușiu, bolile la păstrare									
Kuprumacs 840 DF 2,5 - 3,0 kg/ha NORDOX 750 WG 1,67 - 3,33 kg/ha rapăn, bacterioze, bacterize, focul bacterian									
căderea frunzelor									
octombrie, noiembrie									
coacerea fructului									
august									
precoacerea fructului									
iulie									
fructul de mărimea nucii 3 cm +									
iunie									
fructul de mărimea alunei									
mai									
căderea petalelor									
înfloritul									
butonul roz									
formare butonului									
urechiușe de șoareci									
aprilie									
conul verde									
martie									
Gilfor 480 SL 2,0 - 4,0 l/ha buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene									

PROTECȚIA MĂRULUI DE DĂUNĂTORI

Mospalat 20 SL 0,3 - 0,45 l/ha; Tepechi 50 WG 0,1 - 0,14 kg/ha afide									
Acarin WP 0,4 - 0,5 kg/ha acarani									
Juvenal 10 EC 0,8 - 1,0 l/ha păduchele din San Jose									
Runner 24 SC 0,5 - 0,75 l/ha; Rapigen 20 SC 0,25 - 0,3 l/ha Proclen 5 WG 0,5 - 0,7 kg/ha molii coji fructelor, viermele merelor, molii orientală, molii miniere									
Delfox 25 EC 0,9 - 1,0 l/ha; Zenin 25 SC 0,2 - 0,25 l/ha; Mospalat 20 SL 0,3 - 0,45 l/ha; Arumo SC 0,25 - 0,3 l/ha viermele merelor, molii miniere, afide									
Mospalat 20 SL 0,3 - 0,45 l/ha Zenin 25 SC 0,2 - 0,25 l/ha Arumo SC 0,25 - 0,3 l/ha viespea cu fierăstrău, afide									
fructul de mărimea alunei									
fructul de mărimea nucii									
fructul de mărimea 3 cm +									
precoacerea fructului									
coacerea fructului									
Gilfor 480 SL 2,0 - 4,0 l/ha buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene									
Martie									
Aprilie									
Mai									
Iunie									
Iulie									
August									

POTECȚIA PRUNULUI DE BOLI



Boscad 50 WG 0,4 - 0,5 kg/ha monilioza										
Bercus WG 0,75 - 1,0 kg/ha monilioza										
Kapton 80 WG 2,0 - 2,5 kg/ha; Delin 70 WG; Folipec 80 WG clasterosporioza, polistigmoza										
NORDOX 750 WG 1,67 - 3,33 kg/ha clasterosporioza, bacterioze		Scalos 400 SC 1,0 - 1,5 l/ha Norus 75 WG 0,3 - 0,4 kg/ha arsură monilionă		Scalos 400 SC 1,0 - 1,5 l/ha; Norus 75 WG 0,3 - 0,4 kg/ha Scorus 25 EC 0,25 - 0,3 l/ha; Magnat 75 WG 0,25 - 0,3 kg/ha monilioza, polistigmoza, clasterosporioza				NORDOX 750 WG 1,67 - 3,33 kg/ha clasterosporioza, bacterioze		
Kuprumacs 840 DF 2,5 - 3,0 kg/ha pătarea roșie, ciuruirea micotică și bacteriană										
repaus vegetativ	conul verde	buton alb	floarea	finele înfloritului	desprinderea caliciului	formarea fructelor	creșterea fructelor	precoacerea fructelor	coacerea fructelor	căderea frunzelor
martie	aprilie		mai		iunie		iulie		august	toamna

POTECȚIA PRUNULUI DE DĂUNĂTORI



Acarin WP 0,4 - 0,5 kg/ha; Piromait 50 SC 1,0 - 1,5 l/ha acarieni										
Mospelat 20 SL 0,3 - 0,45 l/ha Arumo SC 0,25 - 0,3 l/ha păduchele cenușiu al prunului										
Runner 24 SC 0,5 - 0,7 l/ha; Proclein 5 WG 0,5 - 0,7 kg/ha molii tortricide										
Mospelat 20 SL 0,3 - 0,45 l/ha Zenin 25 SC 0,2 l/ha Arumo SC 0,25 - 0,3 l/ha Runner 24 SC 0,5 - 0,7 l/ha Proclein 5WG 0,5 - 0,7 kg/ha Rapigen 20 SC 0,175 l/ha Juvenal 10 EC 0,8 - 1,0 l/ha viespea semintelor de prun										
Mospelat 20 SL 0,3 - 0,45 l/ha Zenin 25 SC 0,2 l/ha Delfox 25 EC 0,9 - 1,0 l/ha Arumo SC 0,25 - 0,3 l/ha viespea semintelor de prun										
Juvenal 10 EC 0,8 - 1,0 l/ha păduchele țestos al prunului										
Juvenal 10 EC 0,8 - 1,0 l/ha păduchele țestos al prunului										
desprinderea caliciului										
formarea fructelor										
creșterea fructelor										
precoacerea fructelor										
coacerea fructelor										
căderea frunzelor										
toamna										
august										
iulie										
iunie										
mai										
aprilie										
martie										

PROTECȚIA VIȚEI DE VIE DE BOLI

Azoxin 25 SC 0,6 - 0,8 l/ha făinare, mana					Boscad 50 WG 1,0 - 1,2 kg/ha putregai cenușiu				
					Scalos 400 SC 2,0 - 2,5 l/ha putregai cenușiu				
Nobel 25 EW 0,8 - 1,5 l/ha; Rotengo 20 SC 0,4 - 0,5 l/ha Topik 10 EC 0,35 - 0,45 l/ha; Magnat 75 WG 0,25 - 0,3 kg/ha oidium - făinare					Forsaj 62,5 WG putregai cenușiu				
Cooper-M 45 WP 2,0 - 2,5 kg/ha mana, antracnoze, brenerul					Cooper-M 45 WP 2,0 - 2,5 kg/ha mana, antracnoze, brenerul				
Kuprumacs 840 DF 2,5 - 3,0 kg/ha NORDOX 750 WG 2,0 kg/ha mana, antracnoza, brenerul					Kuprumacs 840 DF 2,5 - 3,0 kg/ha; Kepton 80 WG NORDOX 750 WG 2,0 kg/ha; Nanto 50 SC Elalim 80 WP 3,0 - 3,5 kg/ha mana, antracnoza, brenerul				
NORDOX 750 WG 5,33 kg/ha mana, necroza bacteriană					NORDOX 750 WG 5,33 kg/ha mana, necroza bacteriană				
3 - 5 frunzulițe	15 - 30 cm lungimea lăstarilor	începutul înfloririi	înfloritul	sfârșitul înfloririi	formarea bobitelor	compactarea bobitelor	începutul coacerii	coacerea	după căderea frunzelor

PROTECȚIA VIȚEI DE VIE DE DĂUNĂTORI

Acarin WP 0,4 - 0,5 kg/ha; Promait 50 SC 1,0 - 1,5 l/ha acarieni									
Mospelat 20 SL 0,2 - 0,3 l/ha moliițe viței de vie, cicorițele					Mospelat 20 SL 0,2 - 0,3 l/ha Rapigen 20 SC 0,15-0,25 l/ha moliițe viței de vie				
3 - 5 frunzulițe	15 - 30 cm lungimea lăstarilor	începutul înfloririi	înfloritul	sfârșitul înfloririi	formarea bobitelor	compactarea bobitelor	începutul coacerii	coacerea	

Tripto Max SC 0,5 - 0,6 l/ha	faza aze - prima frunză	3 frunze	înfrățirea	1-2 internod	frunza standard	spic în burduf	aparitia spicului	înflorit	coacerea în lapte	coacerea în ceară	recoltarea
	Mospelat 20 SL 0,25 l/ha; Delfox 25 EC ploșnițe, tripsul grâului, gândacul ovăzului, muștele cerealelor Zenin 25 SC 0,1 l/ha ploșnița asiatică, tripsul grâului, gândacul ovăzului										
	Neo Super SC 0,6 - 0,7 l/ha rugină brună, septorioza, fuzarioza spicelor										
	Magnet 75 WG 0,3 - 0,4 g/ha helminthosporioze, făinarea										
	Star Super EC 0,5 - 0,7 l/ha buriuni dicotiledonate anuale și perene Grin Star 75 WG 20 - 25 g/ha + SAS Trant 200 ml/ha buriuni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4 D și unele perene Floramix SE 0,4 - 0,6 l/ha buriuni dicotiledonate anuale și unele perene										